

Comenzado el	jueves, 21 de junio de 2018, 17:20
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 21 de junio de 2018, 17:48
Tiempo empleado	27 minutos 58 segundos
Puntos	15,00/20,00
Calificación	7,50 de un máximo de 10,00 (75%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los ISRS ¿cuál está desaconsejado en niños y adolescentes por haberse detectado un aumento de la ideación suicida asociada a su uso?

Seleccione una:



a. Citalopram



b. Paroxetina ✓



c. Sertralina



d. Escitalopram

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la verdadera para el uso de antidepresivos en niños y adolescentes:

Seleccione una:



a. Los niños prepuberales tienen más riesgo de sufrir efectos adversos activadores con los ISRS que los adultos.



b. Se ha detectado un aumento del riesgo de suicidio con venlafaxina.



c. Los antidepresivos tricíclicos son poco efectivos en niños.



d. Todas son verdaderas. ✓

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con el uso de psicofármacos en el anciano debemos tener en cuenta:
Seleccione una:

- ☐ a. Su mayor sensibilidad a la acción depresora central de los psicofármacos.
- ☒ b. La cardiotoxicidad que producen todos los psicofármacos. ✗
- ☐ c. El efecto "techo de dosis" que se produce con los ansiolíticos.
- ☐ d. Las respuestas a y c son verdaderas.

Pregunta 4

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué fármacos están desaconsejados si existe demencia o deterioro cognitivo?
Seleccione una:

- ☒ a. Los anticolinérgicos. ✓
- ☐ b. Los neurolepticos.
- ☐ c. Los serotoninérgicos.
- ☐ d. Los antidepresivos.

Pregunta 5

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un anciano que muestra un estado de agitación o alteración conductual grave en el transcurso de la fase aguda de una cardiopatía se puede administrar:
Seleccione una:

- ☐ a. Clorazepato.
- ☒ b. Haloperidol. ✓
- ☐ c. Levomepromazina.
- ☐ d. Clorpromazina.

Pregunta 6

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De entre los antipsicóticos atípicos hay uno que tiene como efectos sobre el feto alteraciones en el metabolismo, hiperglucemia tras el parto y peso mayor para la edad gestacional, ¿cuál de los siguientes es?

Seleccione una:

- ☒ a. Olanzapina ✓
- ☐ b. Aripiprazol
- ☐ c. Topiramato
- ☐ d. Quetiapina

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuál de los siguientes factores no altera la biodisponibilidad de los fármacos en el anciano:

Seleccione una:

- ☐ a. El aumento del pH gástrico.
- ☐ b. La disminución del tejido magro.
- ☐ c. La disminución de la motilidad intestinal.
- ☒ d. El aumento del flujo sanguíneo. ✓

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el manejo de la agitación aguda con agresividad en menores de 18 años con diagnóstico de psicosis parece demostrar especial efectividad:

Seleccione una:

- ☐ a. Haloperidol.
- ☒ b. Clorpromazina. ✓
- ☐ c. Clonazepam.



d. Clozapina.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el tratamiento urgente de la agitación maníaca hay un protocolo general que se considera efectivo al margen de las modificaciones personales. Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. De inicio se administrará 10mg de haloperidol VO (o IM si procede), a los 60 minutos, si no se ha resuelto, se añadirán 5mg de haloperidol. Tras una nueva valoración a los 60 minutos se pueden añadir 25-50mg de levomepromazina si no ha cedido.



b. Como inicio se administrarán 10mg de olanzapina IM + clorazepato 10mg IM repitiendo a los 60 minutos si fuera necesario.



c. De inicio se administrará una dosis de 400mg de litio de rescate más un ansiolítico que se podrá repetir si a los 30 minutos no ha cedido.



d. Ninguna es verdadera. **X**

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la edad mínima de administración de las benzodiacepinas señala la falsa:

Seleccione una:



a. El clorazepato se puede administrar a partir de los 30 meses.



b. El lorazepam no está indicado en menores de 6 años.



c. El clonazepam se puede administrar en mayores de un mes.



d. El alprazolam se puede administrar en mayores de 16 años. **✓**

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El consumo de Antidepresivos Tricíclicos durante el embarazo puede tener consecuencias en el feto que se manifiestan en las primeras 12 horas tras el parto, señala cuál no sería una de esas consecuencias:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuadro de toxicidad fetal.
- ☐ b. Síndrome de abstinencia neonatal.
- ☐ c. Efectos anticolinérgicos.
- ☒ d. Crisis convulsivas. ✓

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El único antipsicótico atípico autorizado en menores de 5 años es:

Seleccione una:

- ☐ a. Risperidona.
- ☐ b. Clozapina.
- ☐ c. Aripiprazol.
- ☒ d. Ningún antipsicótico atípico está autorizado en menores de 5 años. ✓

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los antidepresivos de elección en la infancia son:

Seleccione una:

- ☐ a. IMAO
- ☒ b. ISRS ✓
- ☐ c. Bupropión
- ☐ d. ATC

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es la dosis de ansiolítico a partir de la cuál se detecta el efecto "techo de dosis" en el anciano?

Seleccione una:

- ☐ a. 1-2mg/día
- ☐ b. mayor que 2mg/día
- ☒ c. mayor que 2-3mg/día ✓
- ☐ d. mayor que 4mg/día

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente con diagnóstico de psicosis y diabetes mellitus el antipsicótico de elección de entre los siguientes será:

Seleccione una:

- ☐ a. Olanzapina
- ☐ b. Quetiapina
- ☐ c. Risperidona
- ☒ d. Aripiprazol ✓

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al llamado "uso compasivo del medicamento":

Seleccione una:

- ☐ a. Es responsabilidad compartida del médico, el paciente y el resto del personal según lo establecido en el RD223/2004.
- ☐ b. Está avalado por ensayos clínicos.
- ☐ c. Se refiere al uso de medicamentos en indicaciones o condiciones distintas de las autorizadas expresamente.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✗

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el tratamiento específico del insomnio en niños se utiliza:
Seleccione una:

- ☐ a. Lormetazepam
- ☐ b. Lorazepam
- ☐ c. Clonazepam
- ☒ d. Ninguna es verdadera ✓

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En adolescentes el uso de antipsicóticos atípicos se relaciona con:
Seleccione una:

- ☐ a. Aumento grave de la prolactina.
- ☐ b. Distonías.
- ☐ c. Taquicardia.
- ☒ d. Todas son verdaderas. ✓

Pregunta 19

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De los siguientes efectos secundarios asociados al uso de psicoestimulantes para el tratamiento del TDAH en la infancia, ¿cuál no motivaría la suspensión del tratamiento?
Seleccione una:

- ☒ a. Pérdida de apetito. ✗
- ☐ b. Cefalea.
- ☐ c. Agitación.
- ☐ d. Hipersomnia.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el tratamiento de la dependencia a la nicotina en embarazadas se puede utilizar:
Seleccione una:



a. Parches de nicotina.



b. Chicles de nicotina puntuales pero no parches de liberación prolongada. **X**



c. Bupropión.



d. Ninguno de los anteriores.