

<b>Comenzado el</b>	jueves, 21 de junio de 2018, 18:12
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 21 de junio de 2018, 18:15
<b>Tiempo empleado</b>	2 minutos 44 segundos
<b>Calificación</b>	<b>9,00</b> de un máximo de 10,00 ( <b>90%</b> )
<b>Comentario -</b>	<b>Apto</b>

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Mujer de 30 años embarazada de 22 semanas, diagnosticada de Trastorno Bipolar desde los 18 años en tratamiento con litio 400mg 1-0-1, acude a la urgencia hospitalaria acompañada por su pareja con un cuadro de ansiedad que tiene su origen en la preocupación que le causa que el feto pueda desarrollar una cardiopatía congénita grave derivada de su tratamiento con litio de la que ha leído en los últimos días. ¿De qué problema está hablando la mujer?

Seleccione una:



a. Anomalía de Ebstein. ✓



b. Síndrome de toxicidad neonatal.



c. Síndrome de Guillain Barré.



d. Tetralogía de Fallot.

### Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Se realiza una intervención verbal para disminuir el cuadro ansioso que presenta la mujer, pero no es suficiente, ante el severo estado ansioso se decide que precisa un ansiolítico de rescate, ¿cuál de los siguientes fármacos es de elección para el tratamiento de la ansiedad puntual durante la gestación?

Seleccione una:



a. Alprazolam. ✗



b. Haloperidol.



c. Lorazepam.



d. Durante la gestación no es recomendable administrar tratamiento ansiolítico, por lo que se deberá continuar la intervención verbal hasta que el cuadro de ansiedad ceda.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La paciente continúa preocupada por el riesgo de malformaciones congénitas que conlleva el tratamiento psicofarmacológico de su enfermedad, en este sentido la informamos de que:  
Seleccione una:

- ☐ a. Por el riesgo de malformaciones es recomendable que, con su psiquiatra, cambie el tratamiento psicofarmacológico que sigue por uno que esté clasificado por la FDA como "sin riesgo".
- ☐ b. Sólo el 2% de las anomalías congénitas se relacionan con el uso de psicofármacos.
- ☐ c. La incidencia de malformaciones y abortos es mayor en las mujeres diagnosticadas de algún tipo de psicosis que no siguen tratamiento.
- ☒ d. Las respuestas 2 y 3 son verdaderas. ✓

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a la ansiedad, al realizar la exploración, la paciente nos comenta que en las últimas semanas ha tenido episodios de ansiedad en el domicilio, y que le gustaría poder tomar alguna planta medicinal ansiolítica en lugar de tratamiento farmacológico. Nuestra recomendación será:  
Seleccione una:

- ☐ a. Utilizar Valeriana officinalis en dosis no mayores a una taza al día.
- ☐ b. Utilizar sólo Manzanilla común.
- ☒ c. No utilizar de forma indiscriminada las plantas medicinales, ya que pueden tener efectos indeseables sobre la gestación y el feto. ✓
- ☐ d. Puede utilizar plantas medicinales ansiolíticas en forma de té e infusiones no superando las dos tazas diarias.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Al inicio de la entrevista hemos preguntado a la gestante sobre su última litemia; nos comenta que tuvo lugar hace algo más de un mes, nos muestra la analítica en la que hay unos valores de litio de 0,9mEq/l. Teniendo esto en cuenta ¿cuándo debe realizarse un nuevo control?

Seleccione una:

- ☐ a. En esta etapa del embarazo el control de la litemia deberá ser cada dos días.
- ☐ b. En esta etapa del embarazo el control de la litemia deberá ser semanal.
- ☒ c. En esta etapa del embarazo el control de la litemia deberá ser mensual. ✓
- ☐ d. En esta etapa del embarazo el control de la litemia deberá ser trimestral.

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El cuadro de ansiedad que presentaba la paciente se resuelve adecuadamente y la mujer vuelve a su domicilio con cita en su CSM para esa misma semana. En la cita de seguimiento expresa su deseo de cambiar el tratamiento con litio por otro psicofármaco hasta el final de la gestación, de los siguientes ¿cuál sería de elección?

Seleccione una:

- ☒ a. Haloperidol. ✓
- ☐ b. Clonazepam.
- ☐ c. Olanzapina.
- ☐ d. No es recomendable que sustituya su tratamiento habitual durante la gestación.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En el caso del Haloperidol, hay una dosis demostrada como inocua para el feto en su uso durante el embarazo, ¿qué dosis es?

Seleccione una:

- ☐ a. 5mg/kg/día.
- ☐ b. 5mg/día.
- ☐ c. 1,2mg/kg.
- ☒ d. 1,2mg/día. ✓

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Finalmente se decide la sustitución del litio por haloperidol en su tratamiento. Sabiendo ésto en el momento del parto habrá que vigilar la posibilidad de que en el feto se de:  
Seleccione una:

- ☐ a. Peso mayor para la edad gestacional.
- ☒ b. Síndrome neuroléptico maligno. ✓
- ☐ c. Hiperglucemia.
- ☐ d. Todas son verdaderas.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante las dudas que le surgen a la madre respecto a la compatibilidad de su tratamiento con la lactancia materna para su hijo recién nacido.... (Señala la verdadera)  
Seleccione una:

- ☐ a. Le informaremos de que en ningún caso es aconsejable lactar durante el uso de tratamiento psicofarmacológico.
- ☐ b. Le informaremos de que hay fármacos psicotrópicos que no se excretan por la leche materna.
- ☒ c. Le informaremos de que todos los psicofármacos se excretan por la leche materna, en especial los antipsicóticos. ✓
- ☐ d. Ninguna es verdadera.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a retomar su tratamiento habitual con litio tras el parto, señala la verdadera:  
Seleccione una:

- ☒ a. Puede restablecerse de inmediato con los niveles terapéuticos previos al embarazo. ✓

- ☐ b. Debe esperar unos meses para restablecer el tratamiento con litio, especialmente si está dando lactancia materna al recién nacido.
- ☐ c. Puede retomar de inmediato el tratamiento con dosis paulatinas.
- ☐ d. Ninguna es verdadera.