

<b>Comenzado el</b>	lunes, 25 de junio de 2018, 15:13
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 25 de junio de 2018, 15:42
<b>Tiempo empleado</b>	29 minutos 30 segundos
<b>Puntos</b>	5,00/5,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de un máximo de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	<b>APTO</b>

#### Información

Marcar pregunta

#### Texto informativo

Niño de 4 años acude a urgencias por dificultad respiratoria, ronquera y babeo. Afebril. No otra sintomatología.

Los padres refieren que ha empezado a toser mientras jugaba con sus juguetes.

Exploración física: Tª: 36°C; TA: 95/53; Fc: 130ppm; Fr: 40rpm; SatO2 90%. Peso 15Kg. Regular estado general; palidez; agitación; retracciones inspiratorias y aleteo nasal. Estridor inspiratorio. ACP: hipoventilación generalizada.

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Ante un paciente que presenta dificultad respiratoria, estridor y SatO2 de 90% ¿qué debemos administrar?

Seleccione una:



a. O2 a alto flujo en mascarilla de no reinhalación. ✓



b. Aerosol de suero salino hipertónico al 2%.



c. Paracetamol.



d. Ninguna es correcta.

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☒ a. Las sibilancias en fase espiratoria son signo de obstrucción de la vía aérea superior. ✓
- ☐ b. Un aumento del esfuerzo respiratorio inspiratorio (retracciones inspiratorias, aleteo nasal) es un signo de obstrucción de la vía aérea superior.
- ☐ c. Un signo de obstrucción de vía aérea superior es el estridor (normalmente inspiratorio, pero puede darse en las dos fases).
- ☐ d. La escasa elevación torácica, la escasa entrada de aire detectada en la auscultación, cianosis, babeo, tos, disociación toracoabdominal y dolor retroesternal pueden indicar obstrucción de la vía aérea superior.

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es una causa común de obstrucción de la vía aérea superior?

Seleccione una:

- ☐ a. Bronquiolitis.
- ☒ b. Aspiración de cuerpo extraño. ✓
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. a y b son incorrectas.

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Durante el manejo de este niño: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos dejar que el niño se coloque en una posición cómoda, por ejemplo, en los brazos de su madre.
- ☐ b. Retirar el cuerpo extraño si es visible.
- ☒ c. Realizar un barrido digital a ciegas como medio para retirar el cuerpo extraño. ✓



d. Decidir si es necesario un procedimiento quirúrgico en la vía aérea (traqueotomía o cricotiroidotomía con aguja).

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las intervenciones iniciales ante una sospecha de obstrucción de la vía aérea superior?

Seleccione una:



a. Identificar el tipo y la gravedad del problema respiratorio.



b. Estabilizar la ventilación y la oxigenación.



c. Realizar una evaluación rápida y detallada de la función respiratoria.



d. Todas son correctas. ✓

[Finalizar revisión](#)