

### Pregunta 1

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cuidados Paliativos se definen como:

Seleccione una:

- a. Cuidados activos, totales e integrales que se proporcionan a los pacientes con una enfermedad en fase avanzada y progresiva, potencialmente mortal y que ya no responde a un tratamiento curativo.
- b. Cuidados activos, totales e integrales que se proporcionan a los pacientes con una enfermedad en fase avanzada y progresiva, potencialmente mortal y que responde a un tratamiento curativo
- c. Cuidados activos, parciales e integrales que se proporcionan a los pacientes con una enfermedad en fase avanzada y progresiva, potencialmente mortal y que ya no responde a un tratamiento curativo.
- d. Cuidados activos, totales e integrales que se proporcionan a los pacientes con una enfermedad en fase poco avanzada y que responde a un tratamiento curativo.

### Pregunta 2

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En la valoración del paciente con dolor hemos de tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Intensidad del dolor.
- b. Factores que lo aumentan o desencadenan.
- c. Patrón del dolor.
- d. Todas son correctas.

### Pregunta 3

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los procedimientos invasivos para el control del dolor (señale la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

- a. Deben reservarse para pacientes que no respondan a medidas más conservadoras.
- b. Pueden ser considerados como el cuarto escalón de la escalera analgésica.
- c. Deben plantearse como primera alternativa al paciente oncológico para el control del dolor
- d. El uso del TENS no se considera procedimiento invasivo.

**Pregunta 4**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De entre los criterios para el uso de fármacos en los pacientes paliativos se encuentran todos los siguientes excepto:

Seleccione una:

- a. No usar nunca la vía oral.
- b. Eficacia comprobada.
- c. Pocos efectos secundarios desagradables.
- d. Administración sencilla.

**Pregunta 5**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Definimos como fármacos coadyuvantes a aquellos que:

Seleccione una:

- a. No tienen techo analgésico.
- b. Se pueden utilizar en todos los escalones de la escalera analgésica.
- c. . Son fármacos que "ayudan" al control del dolor, se emplean junto a los analgésicos primarios
- d. B y C son correctas.

**Pregunta 6**

Sin responder aún  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El aumento de células en un tejido por necesidades de crecimiento es:

Seleccione una:

- a. Displasia
- b. Carcinoma in situ.
- c. Hiperplasia.
- d. Neoplasia.

**Pregunta 7**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro del abordaje terapéutico contra el cáncer la radioterapia es:

Seleccione una:

- a. Un tratamiento sistémico.
- b. Un tratamiento local.
- c. Un tratamiento de soporte.
- d. Un tratamiento coadyuvante.

**Pregunta 8**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El dolor nociceptivo (señale la opción correcta):

Seleccione una:

- a. Puede ser somático o visceral.
- b. Se produce por una lesión del sistema nervioso periférico.
- c. Responde bien a los placebos.



d. Es una exacerbación transitoria del dolor basal.

**Pregunta 9**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a las medidas no farmacológicas para el control del dolor señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. La comunicación es la principal medida no farmacológica.



b. Pueden usarse sin control médico.



c. Constituyen una alternativa a los analgésicos del primer escalón.



d. Sólo deben usarse en pacientes paliativos.

**Pregunta 10**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la hipercalcemia señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. Se considera una urgencia oncológica.



b. Se produce por reabsorción de calcio en los túbulos renales.



c. Se considera frecuente en el carcinoma de mama.



d. Todas son correctas

**Pregunta 11**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de pinchar un catéter tipo reservorio hemos de tener en cuenta

Seleccione una:

- a. Sólo deben pincharse con agujas especiales tipo Hubber o Gripper.
- b. El calibre de la aguja debe determinarse en función de la densidad de la solución a infundir.
- c. La longitud de la aguja debe determinarla el espesor del tejido subcutáneo del paciente.
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 12**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los CTCAE son:

Seleccione una:

- a. Un sistema para gradar los efecto adversos de los tratamientos antineoplásicos.
- b. Una escala de valoración funcional del paciente.
- c. Una escala para valorar la calidad de vida del paciente.
- d. Un patrón para valorar las necesidades del Paciente según M. Gordon.

**Pregunta 13**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

De la siguiente lista de fármacos señale aquellos que se consideran coadyuvantes.

Seleccione una:

- a. Bifosfonatos.
- b. Corticoides.
- c. Antidepresivos.
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 14**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al carcinoma Anaplásico de células pequeñas Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. El carcinoma Anaplásico de células pequeñas es el más frecuente de los tumores malignos de pulmón
- b. Se origina a partir de las células basales.
- c. Tiene un crecimiento rápido y muy invasivo.
- d. Se denomina también tumor de Pancoast.

**Pregunta 15**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto de los cuidados referentes a la alimentación, cuál de los siguientes cuidados no debe contemplarse cuando tratamos a un paciente paliativo:

Seleccione una:

- a. Desdramatizar la inapetencia del paciente.
- b. Adaptar la dieta a la situación concreta del paciente
- c. Obligar al paciente a comer.
- d. Servir pequeñas cantidades en platos pequeños.

**Pregunta 16**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto de la hipodermocclisis, señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Permite hidratar al paciente por vía subcutánea.
- b. Deben utilizarse sueros hipertónicos.
- c. El volumen a infundir no debe sobrepasar los 1500cc/24h.
- d. Es aconsejable utilizar vías diferentes para la hipodermocclisis y para la administración de fármacos.

**Pregunta 17**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los cuidados extraluminales que debemos realizar a los catéteres centrales de larga duración, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Retirar el apósito tras las primeras 24-48h eliminando los restos hemáticos.
- b. Comprobar la permeabilidad del catéter.
- c. Rotar las zonas de fijación para evitar la aparición de decúbitos.
- d. Todas son correctas.

**Pregunta 18**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a los marcadores tumorales, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Son proteínas que se encuentran que se encuentran en el suero y otros líquidos corporales.
- b. Sólo están aumentados en presencia de células tumorales malignas.
- c. Se utilizan fundamentalmente para valorar la respuesta del paciente al tratamiento.
- d. A y C son correctas.

**Pregunta 19**

Respuesta guardada  
Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las características de las células tumorales no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Aumento de la especialización y la diferenciación.
- b. Aumento de la inhibición por contacto.



c. Aumento de la capacidad de apoptosis.



d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 20**

Respuesta guardada

Puntuación como 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. Las células tumorales liberan prostaglandinas, citoquinas y factores de crecimiento que atraen células inflamatorias y activan los nociceptores.



b. El dolor influye negativamente en el ánimo, el apetito, el sueño y las relaciones personales de los pacientes oncológicos.



c. Los síndromes paraneoplásicos pueden ser causa de dolor en el paciente oncológico.



d. Todas son correctas.

Siguiente