

## Información

Marcar pregunta

### Texto informativo

Mujer de 64 años de edad, que ingresa en planta procedente de Consulta de Oncología (dónde está siendo tratada de un Ca. De Mama Ductal Infiltrante) por hallazgo de Metástasis cerebrales tras realización de TAC de control. Antecedente Personales: | Fumadora de un paquete de cigarrillos al día. | No alergias conocidas. | No HTA, No DM. | Diagnosticada de Ca. de mama triple negativo, ha recibido quimioterapia neoadyuvante durante los primeros meses del 2015, en Septiembre 2015 se realiza mastectomía+linfadenectomía de mama dcha. | Tras la cirugía continúa con tratamiento de quimioterapia por lesiones en lecho quirúrgico de mastectomía y metástasis en columna dorsal. Exploración física: Afebril. Discreto edema en MSD en relación linfedema post-quirúrgico. -TA: 134/76-FC.: 86 Analítica sanguínea sin hallazgos significativos, salvo una ligera Trombocitopenia. Consciente, orientada. Refiere dolor en la región frontal de la cabeza tipo pinchazo, que cede con analgesia del primer escalón, sin náuseas o vómitos asociados. Portadora de catéter central tipo port-a-cath en zona infraclavicular izda. (Sin pinchar).

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

¿Qué un tumor sea infiltrante quiere decir?:

Seleccione una:

- ☐
- ☒
- ☐
- ☐

- a. Que el tumor está infiltrado por vasos sanguíneos.
- b. Que el tumor atraviesa la membrana basal. ✓
- c. Que el tumor no infiltra la membrana basal.
- d. Que el tumor ha llegado a los nódulos linfáticos.

### Retroalimentación

Los tumores que no atraviesan la membrana basal se llaman in situ y los que atraviesan la membrana infiltrante.

La respuesta correcta es: Que el tumor atraviesa la membrana basal.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El término neoadyuvante , significa:

Seleccione una:

- ☐ a. se pretende la erradicación de la enfermedad
- ☐ b. se pretende mejorar algún síntoma
- ☒ c. se realiza antes de la cirugía para reducir la masa a extirpar ✓
- ☐ d. se administra tras un tratamiento local para aumentar el control locorregional de la enfermedad

#### Retroalimentación

Los tratamientos antineoplásicos pueden ser: Curativos=se pretende la erradicación de la enfermedad. Paliativos=se pretende mejorar algún síntoma. Adyuvantes=se administra tras un tratamiento local para aumentar el control locorregional de la enfermedad. Neoadyuvantes =antes de la cirugía para reducir la masa a extirpar.

La respuesta correcta es:

se realiza antes de la cirugía para reducir la masa a extirpar

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

La paciente al ingreso, está consciente y orientada en las tres esferas, es independiente para las actividades de la vida diaria y realiza una vida activa. En la escala ECOG ¿Cuál sería su puntuación?:

Seleccione una:

- ☐ a. 1
- ☐ b. 2
- ☒ c. 0 ✓
- ☐ d. 3

#### Retroalimentación

Escala ECOG: Mide la repercusión funcional de la enfermedad oncológica en el paciente como criterio de progresión. 0=Asintomático. Totalmente Activo 1=Restricción actividad intensa. Capaz de trabajo ordinario. 2=Ambulatorio y capaz de autocuidados. Incapaz para trabajar. Más del 50% del tiempo despierto , levantado 3=Capaz de algún Autocuidado. Vida cama-sillón. Más del 50% despierto 4=Incapacidad total. 100% del tiempo despierto cama -sillón. 5=exitus

La respuesta correcta es: 0

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

En la valoración al ingreso, que la paciente presenta dolor en la cabeza. ¿Qué otros datos necesitaríamos averiguar para valorar correctamente el dolor de la paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración del dolor mediante escalas
- ☐ b. Factores desencadenantes.
- ☐ c. Efectos del dolor sobre las actividades de la vida diaria..
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

#### Retroalimentación

FACTORES A EVALUAR EN LA VALORACIÓN DE UN PACIENTE CON DOLOR: Intensidad del dolor. Tipo de dolor. Patrón del dolor. Factores desencadenantes. Factores de alivio. Síntomas que acompañan al dolor oncológico. Efectos del dolor sobre las actividades de la vida diaria. Examen físico del paciente oncológico

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

La paciente refiere durante el transcurso del ingreso empeoramiento de sus cefaleas no encontrando alivio con el analgésico prescrito por lo que se decide iniciar pauta con Tramadol. Este fármaco es:

Seleccione una:

- ☐ a. un fármaco coadyuvante.
- ☒ b. un analgésico del segundo escalón. ✓
- ☐ c. un analgésico del tercer escalón.
- ☐ d. un analgésico del primer escalón más potente que el pautado anteriormente.

#### Retroalimentación

Fármaco del segundo escalón. Agonista opioide con doble mecanismo de acción (opioide débil más inhibidor de la recaptación de serotonina).

La respuesta correcta es: un analgésico del segundo escalón.