

# Autoevaluación asignatura 7

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En cuanto al «Abruptio Placentae» o Desprendimiento de Placenta es falso:

Seleccione una:

- a. Es inicialmente una hemorragia retroplacentaria y posteriormente el desprendimiento de la placenta.
- b. Supone un cuadro de gran severidad tanto para el feto como para la madre.
- c. Un desprendimiento de más del 10% supone un alto riesgo de muerte fetal. ✓
- d. Puede desencadenar un cuadro de Coagulación Intravascular Diseminada (CID).

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las principales causas de traumatismo obstétrico son:

Seleccione una:

- a. Accidentes únicamente, sobre todo automovilístico.
- b. Golpes por malos tratos.
- c. Caídas.
- d. Caídas, accidentes, golpes por malos tratos y heridas por arma blanca o de fuego. ✓

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En relación al tipo de traumatismo, podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. La mayoría de los traumatismos que sufren las embarazadas son menores.
- b. A partir del tercer trimestre (32 semanas) la gestante es más susceptible a las caídas.
- c. El traumatismo mayor se asocia con politrauma y afectación sistémica de la embarazada
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

## Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El traumatismo mayor se asocia con:

Seleccione una:

- a. Politrauma y afectación sistémica de la embarazada. ✓
- b. Se deben a la alteración de la estática corporal
- c. Entraña un número limitado de magulladuras, laceraciones y contusiones.
- d. Genera un sentimiento social de rechazo.

## Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Son modificaciones del aparato urinario excepto:

Seleccione una:

- a. La vejiga se distiende y se convierte en un órgano extrapélvico.
- b. Se produce una dilatación y una disminución del tono de los uréteres.
- c. Disminuye el riesgo de infecciones urinarias. ✓
- d. El riego sanguíneo renal y una filtración glomerular aumentan.

## Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las repercusiones de los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden influir:

Seleccione una:

- a. El resultado de las pruebas diagnósticas complementarias no se ve afectado.
- b. Altera los signos y síntomas de las lesiones
- c. En la valoración de la embarazada que ha sufrido traumatismo.
- d. B y c son correctas. ✓

## Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El traumatismo abdominal cerrado se caracteriza:

Seleccione una:

- a. Golpes directos al abdomen sin heridas externas como consecuencia de accidentes con vehículos motorizados, caídas y agresiones.
- b. Ocasionado por armas de fuego o armas blancas.
- c. Las contusiones pulmonares son las más frecuentes.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✗

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La muerte materna de causa traumática se caracteriza porque:

Seleccione una:

- a. Casi siempre es el resultado de lesiones cerebrales o shock hemorrágico.
- b. Alrededor del 8% de los embarazos resultan complicados por traumatismos físicos.
- c. A medida que progresa el embarazo parece aumentar el riesgo de traumatismos.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Son consideraciones respecto al triage en embarazadas:

Seleccione una:

- a. Se considerarán a las pacientes de alto riesgo con indicación siempre de traslado
- b. La catalogación de no viable no contraindica inicialmente el traslado dada la posibilidad de viabilidad fetal.
- c. A y b no son correctas.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En la mujer embarazada disminuye la tolerancia a la hipoxia y a la apnea a causa de:

Seleccione una:

- a. La disminución de su capacidad residual funcional
- b. El aumento de la pérdida renal de bicarbonato
- c. La acidosis se desarrolla con mayor rapidez en la mujer gestante.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

## Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Dentro de las lesiones específicas de la gestante, encontramos:

Seleccione una:

- a. Fractura pélvica
- b. Lesiones intraabdominales.
- c. Traumatismo uterino.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En cuanto a la aspiración gástrica previa intubación podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. Toda embarazada se considerará «con estómago lleno» de cara a la intubación.
- b. Se debe al enlentecimiento del vaciado gástrico.
- c. No sufre variaciones con la paciente no gestante.
- d. A y b son correctas. ✓

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Respecto a los condicionantes que afectan al éxito de la cesárea, es falso:

Seleccione una:

- a. Es independiente la edad gestacional. ✓
- b. Tiempo transcurrido desde el inicio del paro y la misma.
- c. Eficacia de las maniobras de RCP durante la cesárea, ya que no deben interrumpirse.
- d. Etiología de la PCR

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Clínicamente, la rotura uterina puede manifestarse por:

Seleccione una:

- a. Posible irritación peritoneal.
- b. Palpación de partes fetales en la exploración abdominal.
- c. Signos de shock hipovolémico (hemorrágico).
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

## Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Las prioridades en la estabilización inmediata son:

Seleccione una:

- a. Limitados en medida alguna los procedimientos usuales de diagnóstico
- b. Limitados en alguna medida los procedimientos farmacológicos.
- c. No tiene porqué limitar en medida alguna los procedimientos usuales de diagnóstico, farmacológicos o de reanimación.
- d. A y b son correctas. ✗

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Radiológicamente la rotura uterina se manifiesta por:

Seleccione una:

- a. Extremidades fetales en extensión.
- b. Anormal posición del feto.
- c. Presencia de aire libre intraperitoneal
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

## Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La presencia de líquido amniótico en vagina se puede comprobar:

Seleccione una:

- a. Midiendo el Ph vaginal entre 7-7.5 sería indicativo de rotura de membranas.
- b. Midiendo el Ph vaginal entre 4-4.5 sería indicativo de rotura de membranas.
- c. Midiendo el Ph vaginal entre 11-12.5 sería indicativo de rotura de membranas. ✗
- d. Sólo mediante ecografía.

## Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

En cuanto a la cesárea de urgencia es cierto:

Seleccione una:

- a. Un aspecto controvertido es el momento de realizar la cesárea en una gestante.
- b. Incluye sólo los casos de cesárea postmortem.
- c. Provoca gran mejora del estado circulatorio
- d. A y c son correctas. ✓

## Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La posición más favorable en la paciente traumatizada de más de 20 semanas de gestación es:

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral izquierdo entre 15° y 30° sobre la horizontal. ✓
- b. Decúbito lateral derecho entre 15° y 30° sobre la horizontal.
- c. Decúbito lateral izquierdo entre 30° y 60° sobre la horizontal.
- d. Decúbito prono.

## Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

El sufrimiento fetal se manifiesta con:

Seleccione una:

- a. Desaceleraciones fetales después de las contracciones uterinas.
- b. Mayor variabilidad de la Frecuencia Cardiaca Fetal.
- c. Frecuencia cardiaca fetal mayor de 160 Lat./minuto ó menor de 110 Lat./minuto.
- d. A y c son correctas. ✓