



A Project of the European Multiple Sclerosis Platform

[Inicio](#) [Supporters](#) [Declaración de la Misión](#) [Comité](#) [Acreditación](#) [Mi Plan de Acción](#) [Aprobación](#) [Recursos](#) [Glosario](#) [Comuníquese con Nosotros](#)Módulo 1
Comprensión de la EMMódulo 2
Presentación ClínicaMódulo 3
Diagnóstico y EvaluaciónMódulo 4
TratamientoMódulo 5
Cuidado y Apoyo Module 6

Página 1 de 4

Módulo 2: Presentación Clínica**Acreditación**

Responda a todas las preguntas a continuación escogiendo la mejor respuesta. Debe lograr un resultado de al menos 75% para completar correctamente el módulo y obtener créditos.

1. El inicio de la EM normalmente se produce en personas que tienen la siguiente edad:

- ☒ a) 20 – 40 años
- ☐ b) 40 - 50 años
- ☐ c) 10 - 30 años
- ☐ d) 30 - 50 años

2. Al inicio, ¿la EM sigue un patrón de recaída-remisión en aproximadamente qué porcentaje de pacientes?

- ☐ a) 15
- ☐ b) 30
- ☐ c) 50
- ☒ d) 85

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la EM es verdadera?

- ☐ a) La expectativa de vida desde el momento del diagnóstico es de aproximadamente 10 años
- ☐ b) La edad del inicio es de 40 - 60 años
- ☒ c) La EM afecta más a mujeres que a hombres
- ☐ d) El desarrollo reciente de una cura para la EM ha traído esperanza a los pacientes y sus familias

4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la EM es falsa?

- ☐ a) Las personas con EM frecuentemente experimentan déficits neurológicos como temblores, pérdida sensorial e incontinencia de la vejiga
- ☐ b) Los síntomas secundarios de la EM incluyen infecciones de la vejiga y úlceras por presión
- ☒ c) El deterioro cognitivo en personas con EM se produce muy raramente
- ☐ d) Los síntomas y signos neurológicos asociados con la EM dependen de la ubicación de las lesiones en el SNC

5. Los síntomas que se ha demostrado que tienen un impacto importante en la calidad de vida de las personas con EM incluyen:

- ☐ a) fatiga
- ☐ b) depresión
- ☐ c) dolor
- ☒ d) todo lo anterior

6. Uno de los síntomas más comunes de la EM, que afecta al 75-95 % de los pacientes es:

[1.0 Introducción](#)[2.0 Tipos y Características Clínicas](#)[3.0 Signos y Síntomas Treípicos](#)[4.0 Diferenciación de la Presentación Clínica Inicial y Un Brote](#)[5.0 Presentación Atípica](#)[6.0 Pronóstico](#)[Resumen del Módulo](#)[Evaluación de Acreditación](#)[Realizar la Evaluación](#)[Evaluar Módulo](#)[Lectura Recomendada](#)[Referencias Completas](#)[Casos Clínicos](#)[Descarga para imprimir](#)

- ☐ a) depresión
- ☒ b) fatiga
- ☐ c) disfunción de la vejiga
- ☐ d) disfunción cognitiva

7. Los síntomas "invisibles" de la EM incluyen todos los siguientes menos:

- ☐ a) depresión
- ☐ b) fatiga
- ☒ c) sensibilidad al calor
- ☐ d) espasticidad

8. ¿Cuál de las siguientes funciones cognitivas es menos probable que afecte a las personas con EM?

- ☐ a) Memoria episódica
- ☒ b) Memoria a largo plazo
- ☐ c) Procesamiento de la información
- ☐ d) Atención y concentración

9. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones indican la presencia de espasticidad?

- ☐ a) Pérdida de fuerza
- ☐ b) Parestesia, hipoestesia, dolor
- ☐ c) Espasmos musculares dobles causados por el movimiento
- ☐ d) Depresión, inestabilidad emocional
- ☒ e) Todo lo anterior

10. La proporción de pacientes con EM en los cuales el trastorno visual es el primer síntoma clínico es aproximadamente del:

- ☐ a) <10 %
- ☐ b) 15 % al 20 %
- ☒ c) 25 % al 50 %
- ☐ d) >50 %

[Continuar](#)[Volver Arriba](#)