



A Project of the European **Multiple Sclerosis Platform**

[Inicio](#) | [Supporters](#) | [Declaración de la Misión](#) | [Comité](#) | [Acreditación](#) | [Mi Plan de Acción](#) | [Aprobación](#) | [Recursos](#) | [Glosario](#) | [Comuníquese con Nosotros](#)

[Módulo 1
Comprensión de la EM](#) |
 [Módulo 2
Presentación Clínica](#) |
 [Módulo 3
Diagnóstico y Evaluación](#) |
 [Módulo 4
Tratamiento](#) |
 [Módulo 5
Cuidado y Apoyo](#) |
 [Module 6](#)

Página 4 de 4

1.0 Introducción

2.0 Tratamiento de Episodios Agudos

3.0 Prevención de Brotes y Avance de la Enfermedad

4.0 Tratamiento de Síntomas

Resumen del Módulo

Evaluación de Acreditación

Realizar la Evaluación

Evaluar Módulo

Lectura Recomendada

Referencias Completas

Casos Clínicos



Descarga para imprimir

Módulo 4: tratamiento de la EM

Acreditación

Responda a todas las preguntas a continuación escogiendo la mejor respuesta. Debe lograr un resultado de al menos 75% para completar correctamente el módulo y obtener créditos.

31. ¿Para cuál de las siguientes indicaciones se ha aprobado recientemente la fampridina?

- a) Reducir la espasticidad
- b) Mejorar la capacidad de caminar
- c) Ralentizar la tasa de empeoramiento de las funciones cognitivas
- d) Reducir el pie pendular y la debilidad en la parte inferior de las piernas

32. En ensayos clínicos, ¿en qué porcentaje mejoró la fampridina la capacidad de caminar en personas con EM?

- a) 75 y 70 %
- b) 50 y 55%
- c) 35 y 43%
- d) 20 y 25%

33. Las estrategias que pueden contribuir a reducir los síntomas de fatiga en algunos pacientes incluyen:

- a) La evaluación de los patrones del sueño
- b) La terapia con metilfenidato
- c) La terapia con modafinil
- d) Todas las opciones anteriores

34. La terapia intratecal permite que altas concentraciones de baclofén:

- a) atraviesen la barrera hematoencefálica
- b) lleguen a los glóbulos blancos circulantes
- c) penetren directamente en los músculos afectados
- d) accedan al líquido cefalorraquídeo

35. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la utilización de medicina complementaria/alternativa en pacientes con EM es verdadera?

- a) Aproximadamente un 85 % de las personas con EM utilizan medicina complementaria y alternativa
- b) La mayoría de los pacientes con EM que utilizan medicina complementaria y alternativa la usan combinada con su terapia convencional
- c) La mayoría de los pacientes con EM habla de la medicina complementaria y alternativa con sus neurólogos
- d) Todas las anteriores son verdaderas

Please rate your level of agreement with the following statement:

Early initiation of treatment for MS is a potential means of slowing disease progression

- Reject completely
- Reject somewhat
- Neutral
- Accept somewhat
- Accept completely

How confident are you discussing with your patients the safety aspects of drugs currently used to manage MS?

- Not at all confident
- Somewhat confident
- Neutral
- Somewhat confident
- Completely confident

Enviar

[Volver Arriba](#)