

Comenzado el	sábado, 8 de septiembre de 2018, 10:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 8 de septiembre de 2018, 10:31
Tiempo empleado	4 minutos 44 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A la ausencia de error aleatorio o debido al azar se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Validez y fiabilidad.
- ☐ b. Especificidad y fiabilidad.
- ☐ c. Imprecisión o fiabilidad.
- ☒ d. Precisión o fiabilidad ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

A la ausencia de error sistemático se le denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Validez ✓
- ☐ b. Sensibilidad
- ☐ c. Especificidad.
- ☐ d. Sesgo.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Al aumenta el tamaño de las observaciones del estudio (señala la opción correcta):

Seleccione una:

- ☒ a. El error aleatorio disminuye. ✓
- ☐ b. El error aleatorio aumenta.
- ☐ c. El error aleatorio no se modifica.
- ☐ d. Todas son correctas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuál suele ser el nivel de confianza deseado que se fija por el investigador

Seleccione una:

- ☐ a. 75%
- ☐ b. 90%
- ☒ c. 95% ✓
- ☐ d. 99%

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Dentro de las estrategias en la medición para reducir el tamaño de la muestras se encuentra: Señale la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Estandarizar los criterios de medición.
- ☐ b. Usar mediciones precisas.
- ☐ c. Usar valores promedios, para reducir la variabilidad en lugar de emplear solo una medición por paciente.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El procedimientos que permite prevenir la confusión en la fase de diseño es:

Seleccione una:

- ☐ a. Aleatorización.
- ☒ b. Todas son correctas. ✓
- ☐ c. Restricción o especificación.
- ☐ d. Emparejamiento.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

El sesgo que es propio de los estudios de casos y controles que se produce porque un factor de riesgo se asocia a varias enfermedades se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Sesgo por inclusión/ exclusión. ✓
- ☐ b. Sesgo de detección.
- ☐ c. Sesgo de prevalencia o de supervivencia.
- ☐ d. Sesgo de Berkson.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La fuente más importante de confusión residual o ajuste incompleto es: Señala la opción falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas. ✓
- ☐ b. Falta de ajuste por algún factor de confusión.
- ☐ c. Definición inadecuada de las categorías de la variable confusión.
- ☐ d. Utilización de un sucedáneo imperfecto como variable de ajuste para controlar un factor de confusión.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

La posibilidad de poder generalizar o extrapolar los datos a la población de fuera del estudio se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Ambas son correctas.
- ☐ b. Ninguna de las dos.
- ☐ c. Validez interna.
- ☒ d. Validez externa. ✓

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Los requisitos para que una variable o factor extraño se pueda considerar como factor de confusión son: señale la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Estar asociado con la exposición.
- ☐ b. Estar asociado con la enfermedad.
- ☒ c. Todas son correctas. ✓
- ☐ d. No ser un paso intermedio en la secuencia causal ente exposición y enfermedad.
- ☐ e. Rc: modulo 3 página 27.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Qué dos tipos de errores pueden afectar a la medición

Seleccione una:

- ☒ a. Error aleatorio y error sistemático. ✓
- ☐ b. Error aleatorio y error de Pearson
- ☐ c. Error de Pearson y error sistemático
- ☐ d. Ninguno de los anteriores es correcto.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Se define a la distorsión del efecto estimado de la exposición sobre la enfermedad debido a la interposición de un efecto nuevo producido por un factor extraño que no se quiere estudiar, y que origina una mezcla de efectos.

Seleccione una:

- ☒ a. Sesgo de confusion o concepto de confusion. ✓
- ☐ b. Sesgo de Hawthorne
- ☐ c. Sesgo protopático
- ☐ d. Ninguno es correcto.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale cual es la primera fuente de error aleatorio

Seleccione una:

- ☐ a. Laxabilidad.
- ☐ b. Ninguna es correcta.
- ☐ c. Variabilidad.
- ☒ d. Error muestral. ✓

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la correcta sobre el muestreo probabilístico:

Seleccione una:

- ☐ a. Es aquel en el que se desconoce la probabilidad de que la unidad de observación sea seleccionada.
- ☒ b. Es aquel en el que cada unidad de muestreo tiene la misma y conocida probabilidad de ser seleccionado como muestra. ✓
- ☐ c. Todas son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la correcta sobre la causa de producción de un sesgo de clasificación:

Seleccione una:

- ☐ a. Error en la medida.
- ☐ b. Error por usar variables sucedáneas que se aproximan a la variable de interés.
- ☐ c. Error en la definición de las variables.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la correcta sobre la población de estudio:

Seleccione una:

- ☐ a. Es la parte de la población de estudio que se seleccionará para el estudio y debe cumplir el criterio de ser representativa de ella.
- ☒ b. Es una parte de la población general y es la parte que es accesible al investigador. ✓
- ☐ c. Todas son incorrectas.
- ☐ d. Es la población a la que le son aplicables los resultados.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la correcta sobre un tipo de variable atendiendo a los fines que cumple un estudio:

Seleccione una:

- ☐ a. Variables que permiten evaluar la aplicabilidad del estudio
- ☐ b. Variables que miden el factor de estudio y las variables de respuesta.
- ☐ c. Variables sociodemográficas que caractericen la población en los rasgos de quienes son.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale la correcta...

Seleccione una:

- ☐ a. Todas son correctas.
- ☐ b. El error sistemático se ve afectado por el tamaño del estudio
- ☐ c. El error sistemático se reduce aumentando el tamaño del estudio.
- ☒ d. El error sistemático no se reduce aumentando el tamaño del estudio. ✓

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Señale tipos de sesgos de clasificación:

Seleccione una:

- ☐ a. Sesgo de diagnóstico
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Sospecha de exposición
- ☐ d. Sesgo de memoria o de recuerdo.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Tipos de sesgos más frecuentes, señale la correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. Sesgo de selección
- ☐ b. Sesgo de información
- ☒ c. Todas son correctas. ✓
- ☐ d. Sesgo de confusión.

[◀ Bloque 1. Unidad 3](#)

Ir a...

[Bloque 1: Unidad 4 ▶](#)