

Comenzado el	jueves, 25 de octubre de 2018, 16:40
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 25 de octubre de 2018, 17:28
Tiempo empleado	47 minutos 42 segundos
Puntos	15,00/18,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Al administrar la medicación a través de una sonda enteral (señala la opción incorrecta).

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos administrar preferentemente formas líquidas.
- ☒ b. Fármacos que deben administrarse en ayunas debemos administrarlos al menos 15-30 minutos antes ✓
- ☐ c. Las preparaciones con cubierta entérica no deben triturarse
- ☐ d. No mezclar con la fórmula nutricional.

La respuesta correcta es: Fármacos que deben administrarse en ayunas debemos administrarlos al menos 15-30 minutos antes

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál de estos métodos no está indicado para la realización de gastrostomía en caso de achalasia.

Seleccione una:

- ☐ a. Gastrostomía quirúrgica.
- ☐ b. Gastrostomía radiológica percutánea (PRG)
- ☐ c. Todas están indicadas.
- ☒ d. Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG) ✓

La respuesta correcta es: Gastrostomía endoscópica percutánea (PEG)

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El control de la diuresis en el seguimiento de la NPD se incluye en...

Seleccione una:

- ☐ a. Controles nutricionales
- ☒ b. Cuidados clínicos básicos ✓
- ☐ c. Controles analíticos
- ☐ d. Control de las vías de acceso enteral.

La respuesta correcta es: Cuidados clínicos básicos

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En cuál de los siguientes casos no está indicada la Nutrición Parenteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas ellas son incorrectas ✓
- ☐ b. Periodo de ayuno superior a 14 días.
- ☐ c. Cuando la vía enteral no es segura
- ☐ d. Tolerancia oral limitada

La respuesta correcta es: Todas ellas son incorrectas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la administración de nutrición enteral intermitente (señala la respuesta correcta).

Seleccione una:

- ☐ a. Puede utilizarse en la administración en intestino.
- ☐ b. No es la forma más fisiológica.
- ☐ c. No produce elevados residuos gástricos.
- ☒ d. Puede administrarse con jeringa ✓

La respuesta correcta es: Puede administrarse con jeringa

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Es contraindicación relativa de la nutrición enteral:

Seleccione una:

- ☒ a. Vómitos incoercibles ✓
- ☐ b. Ileo paralítico
- ☐ c. HDA grave activa
- ☐ d. Malabsorción grave

La respuesta correcta es: Vómitos incoercibles

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

La causa más frecuente de extracción de SNG es:

Seleccione una:

- ☐ a. Movilización del paciente
- ☒ b. Limpieza inadecuada de la sonda ✗
- ☐ c. Tos.
- ☐ d. Pacientes desorientados y agitados.

La respuesta correcta es: Pacientes desorientados y agitados.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La instrucción oral en la educación del paciente/cuidador de la Nutrición Parenteral Domiciliaria (NPD) debe ser... (señala la opción incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Afianzando lo aprendido.
- ☐ b. Con diálogo abierto
- ☐ c. Sencilla y con lenguaje comprensible
- ☒ d. En una sola sesión y de forma no repetitiva ✓

La respuesta correcta es: En una sola sesión y de forma no repetitiva

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La longitud mínima de la SNG en adultos debe ser...

Seleccione una:

- ☐ a. 75 cm.
- ☐ b. 120 cm.
- ☒ c. 90 cm. ✓
- ☐ d. 60 cm.

La respuesta correcta es: 90 cm.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La osmolalidad de la formula nutricional viene determinada por...

Seleccione una:

- ☐ a. A. Hidratos de Carbono
- ☐ b. B. Lípidos
- ☐ c. C. Proteínas
- ☒ d. A y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La yeyunostomía está contraindicada en caso de...

Seleccione una:

- ☐ a. A. Fístula digestiva alta.
- ☒ b. A y C son correctas ✓
- ☐ c. B. Estenosis pilórica.
- ☐ d. C. Ascitis masiva

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las complicaciones más frecuentes relacionadas con la Nutrición Enteral son...

Seleccione una:

- ☐ a. A. Metabólicas
- ☐ b. C. Gastrointestinales
- ☐ c. B. Complicaciones de la sonda
- ☒ d. B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale la opción incorrecta: Las formulas poliméricas suelen incluir como fuente de hidratos de carbono...

Seleccione una:

- ☐ a. Almidón
- ☒ b. Disacáridos ✓
- ☐ c. Dextrinomaltosa
- ☐ d. Polisacáridos de glucosa.

La respuesta correcta es: Disacáridos

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la opción incorrecta respecto a las nutriciones parenterales todo en uno.

Seleccione una:

- ☐ a. Incluyen aminoácidos, lípidos e hidratos de carbono
- ☐ b. Necesitan menos manipulación
- ☒ c. Requieren mayor gasto de fungible y personal sanitario. ✓
- ☐ d. Necesitan una bomba de administración

La respuesta correcta es: Requieren mayor gasto de fungible y personal sanitario.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Si se prevé la administración de nutrición enteral más de 6 semanas en un paciente con bajo nivel de conciencia la vía de administración adecuada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Sonda nasoyeyunal
- ☒ b. Gastrostomía ✗
- ☐ c. Sonda gástrica.
- ☐ d. Yeyunostomía

La respuesta correcta es: Yeyunostomía

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Señale la opción falsa: Son causas de diarrea durante la administración de la Nutrición Enteral:

Seleccione una:

- ☐ a. Fórmula hiperosmolar
- ☐ b. Contaminación de la fórmula nutricional.
- ☐ c. Administración intermitente
- ☒ d. Flujo rápido ✖

La respuesta correcta es: Administración intermitente

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una fórmula nutricional considerada hiperproteica aporta...

Seleccione una:

- ☐ a. >25% de las calorías en forma de proteínas
- ☐ b. >20% de las calorías en forma de proteínas
- ☐ c. >15% de las calorías en forma de proteínas
- ☒ d. >18% de las calorías en forma de proteínas ✔

La respuesta correcta es: >18% de las calorías en forma de proteínas

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una fórmula nutricional se considera hipercalórica si aporta...

Seleccione una:

- ☒ a. >1,1 kcal/ml ✔
- ☐ b. >2 kcal/ml
- ☐ c. >1,3 kcal/ml
- ☐ d. >1,5 kcal/ml.

La respuesta correcta es: >1,1 kcal/ml

[◀ Módulo IV : Nutrición artificial](#)

Ir a...

[Módulo V. Educación nutricional y salud comunitaria. ▶](#)