

Comenzado el jueves, 25 de octubre de 2018, 18:19

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 25 de octubre de 2018, 18:26

Tiempo empleado 7 minutos 8 segundos

Puntos 11,00/15,00

Calificación 7,33 de 10,00 (73%)

Comentario - Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso.

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

A la hora de alimentar a un paciente, es conveniente utilizar una silla de respaldo corto para conseguir que el cuello esté hiperextendido y así conseguir que el ángulo recto del cuello facilite el paso del bolo.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Debemos comprobar siempre el residuo gástrico independientemente del lugar de inserción de la sonda.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✗

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de nuestro paciente, lo indicado es la alimentación de forma intermitente.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de Pablo es posible que no tenga sed en ningún momento del día, por lo que debemos prevenir la deshidratación.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de Pablo estaría indicado comenzar con nutrición enteral.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la formación del cuidador principal debemos incluir los cuidados de la ostomía, entre ellos incluiremos la higiene del estoma con alcohol, procurando no rotar la sonda.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Informaremos al cuidador principal de que una vez abierta la fórmula debe mantenerse en la nevera máximo 24 horas.

Seleccione una:

- ☒ a. verdadero ✓
- ☐ b. falso

Pregunta **8**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

La decisión de indicar la PEG(gastrostomía endoscópica percutánea) es correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La manera adecuada de administrar los fármacos es junto a la nutrición.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

No es conveniente el uso de jeringas como sustituto de la cuchara en el momento de alimentar al paciente.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✗

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Pablo presenta una disfagia tipo estructural.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✗

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para evitar las náuseas y vómitos por la nutrición, conviene ajustar la velocidad de infusión a la tolerancia del paciente.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Para prevenir la obstrucción de la PEG debemos pasar 30-50 cc de agua después de cada toma o después de administrar la medicación.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si observa pérdida de contenido gástrico alrededor del estoma, la medida a seguir sería: comprobar que el balón esté correctamente hinchado y remitir al centro médico.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un programa educativo que incluya instrucciones verbales, evaluaciones teórico-prácticas y demostraciones asegura un menor número de complicaciones al alta.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

[◀ Caso práctico II](#)

Ir a...

[Encuesta de Calidad ▶](#)