

A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño

Seleccione una:

- ☐ a. 90 - 100 lpm
- ☐ b. 70 - 90 lpm
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ d. 100 - 120 lpm


Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al encontrarnos un niño en un restaurante que comienza a toser repentinamente, qué debemos realizar

Seleccione una:

- ☒ a. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz
- ☐ b. Animar a seguir tosiendo si la tos es ineficaz
- ☐ c. Dar 5 golpes interescapulares si la tos es eficaz
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dar 5 golpes interescapulares si la tos es ineficaz

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cómo se debe dar la información a los padres ante el fallecimiento de su hijo.
Señale la falsa

Seleccione una:

- ☐ a. La actitud debe ser profesional, explicando de forma sencilla y clara lo hechos, pero también compasiva, comprendiendo las actitudes y reacciones de los padres.
- ☒ b. Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.
- ☐ c. Explicar inmediatamente y utilizando palabras claras que el niño ha fallecido
- ☐ d. Elegir un lugar adecuado, para facilitar la intimidad y a solas en una habitación


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si se les va a solicitar la autopsia o la donación de órganos, esta petición debe hacerse lo antes posible, ya que es muy importante para el adecuado mantenimiento de los órganos.

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el acceso vascular de elección en una RCP avanzada

Seleccione una:

- ☒ a. Vía intraósea
- ☐ b. Vía venosa central
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ d. Vía intravenosa canalizada antes de un minuto

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía intravenosa canalizada antes de un minuto

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la diferencia fundamental entre la RCP pediátrica y la RCP de adultos

Seleccione una:

- ☒ a. En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Son completamente distintas.
- ☐ d. No hay diferencias fundamentales entre ambas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En que se deben hacer 5 ventilaciones iniciales y un minuto de RCP antes de buscar ayuda.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la energía utilizada para un choque eléctrico en la edad pediátrica

Seleccione una:

- ☐ a. 9 J/K
- ☐ b. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ c. 5 J/K
- ☒ d. 4 J/k

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 4 J/k

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la primera acción a realizar

Seleccione una:

- ☐ a. Comprobar si late el corazón.
- ☐ b. Verificar el estado de consciencia.
- ☐ c. Comprobar si respira.
- ☒ d. Asegurar la seguridad del niño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Asegurar la seguridad del niño.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica más segura para aislar la vía aérea en la RCP avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla laríngea
- ☐ b. Cánula orofaríngea
- ☐ c. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☒ d. Intubación traqueal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación traqueal

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los principios básicos de la ética. Señale la falsa.

Seleccione una:

- ☐ a. Autonomía.
- ☒ b. Independencia
- ☐ c. Beneficencia
- ☐ d. No maleficencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Independencia

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo finalizaremos maniobras de RCP Señale la falsa.

Seleccione una:

- ☒ a. Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos
- ☐ b. Cuando haya signos evidentes de muerte biológica
- ☐ c. Cuando haya por escrito una orden de no reanimar y se compruebe su existencia.
- ☐ d. Cuando el reanimador esté exhausto o en grave peligro

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando la duración de la RCP sea mayor a 15 minutos

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo mejora los resultados de la RCP

Seleccione una:

- ☐ a. Cuando se inicia la RCP básica en menos de 8 minutos.
- ☒ b. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada.
- ☐ c. Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando se inicia la RCP básica por las personas que presencian la parada y se inicia un RCP avanzada antes de los 8 minutos.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué lugar debemos realizar las compresiones torácicas en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- ☒ a. Un través de dedo por encima del apéndice xifoides
- ☐ b. En la base de las costillas
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. En la zona abdominal superior

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un través de dedo por encima del apéndice xifoides

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica Señale la falsa.

Seleccione una:

- ☐ a. El carro se debe mover fácilmente, debe tener cajones y carteles bien visibles y de fácil utilización.
- ☒ b. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización
- ☐ c. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente
- ☐ d. El material debe estar fácilmente visible y ordenado

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es la reanimación cardiopulmonary

Seleccione una:

- ☐ a. Es un procedimiento médico de trabajo.
- ☒ b. Un conjunto de técnicas y maniobras.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores no es correcta.
- ☐ d. Es un consenso internacional.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un conjunto de técnicas y maniobras.

Pregunta **15**

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración

Seleccione una:

- ☒ a. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ c. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.
- ☐ d. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta **16**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué medicación de las siguientes es obligatoria en un carro de parade

Seleccione una:

- ☐ a. Nolotil
- ☐ b. Paracetamol
- ☒ c. Adrenalina
- ☐ d. Ninguna de las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Adrenalina

Pregunta **17**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar. Señale la verdadera.

Seleccione una:

- ☒ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión
- ☐ c. No es necesario que la orden esté por escrito
- ☐ d. Debe ser revisable

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tenemos que hacer si tras estimular el niño no responde

Seleccione una:

- ☐ a. Mover al niño con cuidado y colocarlo en decúbito supino.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. Abrir la vía aérea del niño extendiendo su cabeza y elevando su mandíbula.
- ☐ d. Gritar pidiendo ayuda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, qué maniobra realizaremos

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones son correctas.
- ☐ b. Repetiremos la misma maniobra.
- ☒ c. Realizaremos la tracción mandibular.
- ☐ d. No intentaremos abrir la vía aérea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si sospechamos de obstrucción en la vía aérea para conseguir una ventilación eficaz deberemos

Seleccione una:

- ☐ a. Seguir con las ventilaciones más intensamente
- ☐ b. Hacer un barrido a ciegas con el dedo
- ☒ c. Ninguna de las opciones es correcta
- ☐ d. Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abrir la boca y extraer cualquier causa de obstrucción