


pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO₂ del 100 por ciento usando un flujo de entre 6-15 l/min

Seleccione una:

- a. Mascarilla con reservorio.
- b. Mascarilla Venturi.
- c. Mascarilla simple.
- d. Ninguna de las opciones es correcta


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la administración de enemas. Indica el correcto.

Seleccione una:

- a. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- c. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria. Indica la correcta:

Seleccione una:

- a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
- b. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno. Indica la correcta.

Seleccione una:

- a. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel.
- b. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica. Indica la correcta.

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- c. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- d. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica. Indica la correcta

Seleccione una:

- a. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- b. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- c. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo. Indica la correcta

Seleccione una:

- a. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño.
- b. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Comprobar la correcta identificación del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comprobar la correcta identificación del paciente.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción

Seleccione una:

- a. Por micción espontánea.
- b. Con bolsa adhesiva perineal.
- c. Sondaje vesical.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la colocación de una férula, indica lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Opción 2: Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.
- b. Las opciones 1 y 2 son correctas
- c. Opción 1: Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.
- d. Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la técnica de aspiración de secreciones. Indica lo correcto

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.
- c. Es una técnica no estéril.
- d. Se puede realizar tras las comidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable. Indica la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.
- b. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.

- c. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.
- d. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto

Seleccione una:

- a. Neonato.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Niño pequeño.
- d. Lactante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica.

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Administración de alimentación oral.
- c. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- d. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica la afirmación correcta de la administración de carbón activado.

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatada.
- c. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.
- d. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico

Seleccione una:

- a. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- d. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura central se toma en

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. La cavidad oral.
- c. El recto.
- d. La axila.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El recto.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora. Indica lo incorrecto.

Seleccione una:

- a. Se colocará al paciente en Fowler o Semi-fowler
- b. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.
- c. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos retirar la mascarilla o volver a administrar
- d. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. Férula isquiomaleolar.
- c. Férula posterior de tobillo o suropédica.
- d. Férula isquiopédica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer

Seleccione una:

- a. Las opciones 1 y 2 son correctas.
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- d. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente

Seleccione una:

- a. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.
- b. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.