

Pregunta 1  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Las translucencia nugal se mide aproximadamente:**

Seleccione una:

- a. Entre las semanas 15 y 16
- b. Antes de las 14 semanas. ✓
- c. En la ecografía de 20 semanas
- d. Entre las semanas 14 y 16

La respuesta correcta es: Antes de las 14 semanas.

Pregunta 2  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Las translucencia nugal se mide aproximadamente:**

Seleccione una:

- a. Entre las semanas 15 y 16
- b. En la semana 11 ✓
- c. En la ecografía de 20 semanas
- d. Entre las semanas 14 y 16

La respuesta correcta es: En la semana 11

Pregunta 3  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**La recomendación de la inmunoglobulina anti-D se realiza:**

Seleccione una:

- a. En el segundo trimestre
- b. En el segundo trimestre y si ha sangrado antes ✓
- c. Después del parto
- d. Dependiendo el test de Coombs

La respuesta correcta es: En el segundo trimestre y si ha sangrado antes

Pregunta 4  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**Sobre la anestesia epidural es conveniente:**

Seleccione una:

- a. Informar a la gestante antes del parto
- b. Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar ✓
- c. No hay que informar, pues ya lo harán en el hospital
- d. No es revelante

La respuesta correcta es: Informar por escrito y dar consentimiento para no improvisar

Pregunta 5  
Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
Marcar pregunta

**La S.O.G. de cuatro determinaciones suele solicitarse:**

Seleccione una:

- a. Si existen antecedentes de diabetes gestacional
- b. Si el Test de O'Sullivan es mayor de o igual de 140 mg/dl. ✓
- c. Por protocolo a todas las gestantes
- d. A las 24 semanas

La respuesta correcta es: Si el Test de O'Sullivan es mayor de o igual de 140 mg/dl.