

Pregunta 16
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

La analgesia epidural durante el parto se ha asociado con:

Seleccione una:

- ☐ a. Corioamnionitis, fiebre y sepsis neonatal
- ☒ b. Temblores, fiebre y expulsivo prolongado ✓
- ☐ c. Temblores, incontinencia urinaria y diarrea
- ☐ d. Todas son ciertas

La respuesta correcta es: Temblores, fiebre y expulsivo prolongado

Pregunta 17
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

Un bloqueo epidural extenso:

Seleccione una:

- ☐ a. Se manifiesta por hipotensión y bradicardia
- ☐ b. Es una urgencia vital para la madre y el feto
- ☐ c. La paciente puede entrar en coma
- ☒ d. Todas son ciertas ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 18
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

En las pacientes seropositivas por VIH:

Seleccione una:

- ☐ a. La analgesia epidural está contraindicada
- ☐ b. Es más aconsejable realizar un bloqueo subaracnoideo
- ☐ c. La terapia antirretroviral está contraindicada
- ☒ d. Ninguna es correcta ✓

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 19
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

En relación con la fisiología materna durante el embarazo:

Seleccione una:

- ☐ a. Se establece un estado hiperdinámico
- ☐ b. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca
- ☐ c. Aparece hemodilución
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
🚩 Marcar pregunta

El líquido cefalorraquídeo se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre duramadre y aracnoides
- ☒ b. Entre aracnoides y piamadre ✓
- ☐ c. Por fuera de la aracnoides
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Entre aracnoides y piamadre

[Finalizar revisión](#)