

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Respecto al inicio de la lactancia materna, señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Se realizará tan pronto como la madre y el recién nacido estén preparados
- ☐ b. El momento ideal es inmediatamente después del parto o en las dos primeras horas posteriores
- ☐ c. La administración de petidina durante el parto a la madre puede dificultar el inicio de la lactancia

☒ d. Es preferible esperar a que pase el periodo crítico, para que el recién nacido pueda recuperarse del parto, antes de iniciar la lactancia ✓

La respuesta correcta es: Es preferible esperar a que pase el periodo crítico, para que el recién nacido pueda recuperarse del parto, antes de iniciar la lactancia

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

De las siguientes situaciones, ¿cuáles pueden bloquear la producción y acción de la oxitocina?

Seleccione una:

☒ a. La preocupación y el miedo, entre ellos a no tener suficiente leche ✓

- ☐ b. El dolor de espalda del padre
- ☐ c. La visualización del recién nacido
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: La preocupación y el miedo, entre ellos a no tener suficiente leche

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

De los siguientes factores, ¿cuál no predispone a la madre a contraer una candidiasis del pezón?

Seleccione una:

- ☐ a. Mastitis tratada con antibióticos
- ☐ b. Lesiones en los pezones

☒ c. Dieta pobre en lácteos y dulces ✓

☐ d. La diabetes

La respuesta correcta es: Dieta pobre en lácteos y dulces

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En cuanto a la alimentación de la madre lactante, es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. La composición de la leche guarda una estrecha relación con la alimentación de la madre
- ☐ b. La cantidad de líquidos ingeridos influye en el volumen de leche producido

☒ c. El hambre de la madre puede regular eficazmente la ingesta calórica y no se debe insistir en que coman excesivamente durante la lactancia ✓

☐ d. Determinados alimentos pueden hacer desagradable el sabor de la leche (espárragos, cebolla, ajo, alcachofa, coles de bruselas), por lo se deben evitar para que el bebé no rechace el pecho

La respuesta correcta es: El hambre de la madre puede regular eficazmente la ingesta calórica y no se debe insistir en que coman excesivamente durante la lactancia

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

En la mastitis los síntomas característicos son:

Seleccione una:

☐ a. Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en ambas mamas

☒ b. Enrojecimiento, calor, dolor e hinchazón en uno o varios lóbulos afectados, fiebre y mal estar general ✓