



Navegación por el
cuestionario



[Finalizar revisión](#)

Comenzado el lunes, 25 de marzo de 2019, 17:28
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 25 de marzo de 2019, 17:56
Tiempo empleado 27 minutos 50 segundos
Puntos 20,00/20,00
Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Puede un desfibrilador semiautomático tipo DESA/DEA causar daño a un paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Si, de no estar en PCR.
- ☒ b. No, sólo descargará energía si el paciente en PCR tiene el ritmo adecuado. ✓
- ☐ c. Si, si tiene un ritmo de PCR NO desfibrilable.
- ☐ d. Si, si se invierte la colocación de los parches adhesivos en un DESA/DEA monofasico sin toma de tierra.

Pregunta 2

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Quien es el "gran olvidado" en la RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. El médico.
- ☐ b. El centro coordinador.
- ☒ c. El aspirador de secreciones. ✓
- ☐ d. El cardio-compresor.

Pregunta 3

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Cual es la primera opción de permeabilidad de vía aérea en RCP básica instrumental y avanzada

Seleccione una:

- ☐ a. La Frova.
- ☒ b. Canula orofaríngea. ✓
- ☐ c. La maniobra frente-mentón.
- ☐ d. El combitube.

Pregunta 4

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Los valores normales de Frecuencia Cardíaca (FC) de un recién nacido de entre 3 a 4 Kg de peso, son:

Seleccione una:

- ☐ a. 100 lpm.
- ☐ b. 80-120 lpm.
- ☒ c. 120-180 lpm. ✓
- ☐ d. 100-200 lpm.

Pregunta 5

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Cuál será la primera acción a llevar a cabo en una RCP de un paciente ahogado, al reanimarle en el borde de la piscina de conectar el desfibrilador (DESA/DEA):

Seleccione una:

- ☐ a. Llamar al socorrista acuático.
- ☒ b. Limpiar y secar de agua al paciente y la zona de trabajo. ✓
- ☐ c. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, deteniendo si es preciso la RCP básica.
- ☐ d. Colocarle a la mayor brevedad posible el desfibrilador, SIN detener la RCP básica.

Pregunta 6

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Sistólica (TAS) de un niño recién nacido medida en milímetros de mercurio (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☒ a. 50-75 mmHg. ✓
- ☐ b. 60-80 mmHg.
- ☐ c. 120 mmHg.
- ☐ d. 40-50 mmHg.

Pregunta 7

Correcta
 Puntúa 1,00
 sobre 1,00
 Marcar
 pregunta

En una OVACE, con tos productiva y sospechando obstrucción parcial, NO es correcto:

Seleccione una:

- ☐ a. Incentivar y animar a toser.
- ☐ b. Prepararse para una mala evolución de la obstrucción.
- ☐ c. Vigilar la posible salida del cuerpo extraño de la o en la orofaringe.
- ☒ d. Realizar al paciente 5 compresiones abdominales, colocándolo para ello tumbado en el suelo. ✓

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Las cinco "T" que definen las PCR reversibles son:

Seleccione una:

- ☒ a. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Pulmonar 5)Trombosis Coronaria. ✓
- ☐ b. 1)HemoneumoTórax abierto 2)Talasemia 3)Tóxicos 4)Trauma 5)Torniquete.
- ☐ c. 1)Neumotórax a Tensión 2)Taponamiento cardíaco 3)Tóxicos 4)Trombosis Venosa Profunda 5)Trombosis Coronaria.
- ☐ d. 1)Timo 2)Talamo 3)Tiroides 4)Tallo 5)Temperatura

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

En que momento se administrarán 300mg de Amioradona en una PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Tras la 2ª descarga.
- ☐ b. Tras la 3ª adrenalina.
- ☒ c. Tras la 3ª descarga. ✓
- ☐ d. Tras la 4ª descarga con desfibriladores monofásicos y la 5ª en bifásicos.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

En la PCR Pediátrica, con respecto a la de adulto, aparece:

Seleccione una:

- ☒ a. Las 5 respiraciones de rescate antes de iniciar RCP. ✓
- ☐ b. La apertura de la vía aérea con subluxación mandibular.
- ☐ c. El uso del cardiocompresor automático de forma precoz.
- ☐ d. El golpe precordial.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Que haremos ante una PCR extrahospitalaria, si formamos parte del equipo de soporte vital avanzado que está atendiendo el paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Informar al centro coordinador o central. ✓
- ☐ b. Pedir un DESA/DEA.
- ☐ c. Solicitar servicio de bomberos de apoyo.
- ☐ d. Llamar al 061.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Es motivo de exclusión del procedimiento de donante en asistolia:

Seleccione una:

- ☒ a. Neoplasias previas. ✓
- ☐ b. Más de 50 años de edad.
- ☐ c. Muerte no esperada.
- ☐ d. Accidente doméstico.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Al mejor indicador de la eficiencia de la RCP-A es:

Seleccione una:

- ☒ a. La capnometría/capnografía. ✓
- ☐ b. La pulsioximetría.
- ☐ c. Un electrocardiograma.
- ☐ d. Una gasometria arterial basal.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

No es una mejora a valorar en la RCP-A:

Seleccione una:

- ☐ a. Ecografía.
- ☐ b. Compresor torácico mecánico.
- ☐ c. RCP-ECMO Extracorporea.
- ☒ d. Hipertermia controlada. ✓

Pregunta 15

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

En RCP pediátrica la relación compresiones torácicas - ventilaciones es

Seleccione una:

- ☐ a. 10:1.
- ☐ b. 11:15.
- ☒ c. 15:2 ✓
- ☐ d. 5:2.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar pregunta

Los valores normales de Tensión Arterial Diastólica (TAD) de un niño entre los 8 y 10 años medida en milímetros de mer (mmHg) son:

Seleccione una:

- ☐ a. 60-80 mmHg.
- ☐ b. 95 mmHg.

- ☐ c. 50-80 mmHg.
- ☒ d. 55-90 mmHg. ✓

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Cual es la dosis de Amioradona que se administra tras la 5ª descarga en PCR-A:

Seleccione una:

- ☐ a. 300 mg.
- ☐ b. 120 mg.
- ☒ c. 150 mg. ✓
- ☐ d. 200 mg.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Es efectivo realizar compresiones toracicas sin ventilaciones en RCP básica de personal NO sanitario

Seleccione una:

- ☒ a. Si. ✓
- ☐ b. No.
- ☐ c. Sin ventilaciones no es efectiva la RCP.
- ☐ d. Insuflar es más importante que el "masaje" cardiaco.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Una vez aislada la vía aérea en una RCP-A cual es la relación compresiones torácicas - ventilaciones a seguir:

Seleccione una:

- ☐ a. 30:2.
- ☐ b. 15:2.
- ☐ c. Una vez aislada la vía aérea la relación de masajes torácicos y insuflaciones boca a boca son 30:1.
- ☒ d. Una vez aislada la vía aérea se procurarán 100 compresiones torácicas sin pausa o interrupción. ✓

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Las obstrucciones de vía aérea por cuerpo extraño con un macarrón, alimento hueco o que presenta un espacio abierto en su centro, se consideran:

Seleccione una:

- ☐ a. Una OVACE especialmente sencilla de resolver, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y ab y tanto la tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones toracicas serán más efectivas para movilizar el cuerpo extraño gracias al efecto venturi, además de permitir el paso de aire y una mejor ventilación d paciente durante todo el episodio.
- ☒ b. Una OVACE normal. ✓
- ☐ c. Una OVACE especialmente compleja, ya que por ese hueco circulará el aire de reserva de pulmones y abdomen, y tos, como los golpes interescapulares, las maniobras de heimlich y las compresiones toracicas serán menos efectivas pe movilizar el cuerpo extraño.
- ☐ d. No se considera OVACE, aunque genere los mismos signos y sintomas, se trata de una sensación subjetiva con componente psicossomático, ya que se puede vivir con un macarron alojado en la vía aérea, si este está correctamente ; y orientado.

[Finalizar revisión](#)