

Módulo 1:

1. Con cual de estos huesos no se articula el escafoide de la mano?

Piramidal

2. La clasificación de Neer es ampliamente utilizada para la valoración de fracturas de:

Extremidad proximal de húmero

3. Como se llama la fractura que ocurre sobre un hueso en el lugar de una metástasis ósea?

Fractura patológica

4. La RX simple de abdomen está indicada en todas estas situaciones, excepto en :

Valoración de líquido libre abdominal

5. Respecto a la RX de abdomen en bipedestación:

Se debe de realizar cuando hay dudas de si hay obstrucción por un silencio aéreo en la RX AP

6. En el Íleo paralítico postoperatorio o adinámico o Paralítico se caracteriza:

Todas

7. El aire en el sistema biliar (aerobilia) se caracteriza

b y c correctas

8. Es cierto respecto al signo cervico-torácico:

Si la lesión es anterior se visualiza de forma parcial hasta las clavículas en RX de tórax

9. Son hallazgos propios de la neumonías víricas:

todas

10. Que cuadro de los siguientes puede cursar con megaesófago en una placa de tórax:

enfermedad de chagas

Modulo 2:

1. Con cuál de estos huesos no se articula el escafoides de la mano?

Piramidal

2. ¿Cuál es el hueso que más frecuentemente se fractura en el pie?

Calcáneo

3. Al evaluar una radiografía de columna cervical, son importantes una serie de líneas. ¿Como la llama la línea que pasa por el margen posterior del canal medular?

Linea espinolaminar

4. Ante un traumatismo cervical con sospecha de fractura de apófisis odontoides. ¿Qué proyección complementaria sería más adecuada?

Transbucal

5. Para valorar afectación de partes blandas en una radiografía lateral cervical tras un traumatismo, que distancia le parece patológica para valorar espacio retrotraqueal (entre C5 y C7)?

Más de 22 milímetros o el equivalente a un cuerpo vertebral

6. La clasificación de Neer es ampliamente utilizada para la valoración de fracturas de :

Extremidad proximal de humero

7. ¿Qué articulación es la más frecuentemente implicada en luxaciones?

Hombro

8. Como se llama la fractura que ocurre sobre un hueso en el lugar de una metástasis ósea?

Fractura patológica

9. Cual de estas situaciones se asocia más frecuentemente a traumatismos de alta energía?

Fractura de pelvis

10. Cuál de las siguientes fracturas de cadera no afecta al cuello femoral?

Trocantereaas

Modulo 3:

1. De las siguientes entidades cual no presenta brocograma aéreo:

Adenocarcinoma de pulmón

2. Es cierto respecto al signo cervico-torácico:

Si la lesión es anterior se visualiza de forma parcial hasta las clavículas de RX tórax

3. Son hallazgos propios de las neumonías víricas:

Todas

4. Las infecciones pulmonares por micobacterias atípicas :

todas

5. Qué cuadro de los siguientes puede cursar con megaesófago en una placa de tórax?:

Enfermedad de chagas

6. Respecto al tumor de Pancoast no es cierto:

La mayoría son adenocarcinomas

7. El signo del nenúfar y de la semiluna es típico de uno de los siguientes cuadros:

equinocosis

8. En las neumonitis por hipersensibilidad es falso:

Siempre evoluciona a fibrosis pulmonar

9. La neumopatía intersticial usual cuando evoluciona a fibrosis pulmonar empieza normalmente por:

lóbulos inferiores

10. La radiografía simple de tórax es respecto al total de las exploraciones radiológicas supone aproximadamente:

40% del total

Modulo 4:

1. La RX simple de abdomen está indicada en todas estas situaciones, excepto en :

Valoración de líquido libre abdominal

2. Respecto a la RX de abdomen en bipedestación:

Se debe de realizar cuando hay dudas de si hay obstrucción por un silencio aéreo en la RX AP

3. Cuando en un paciente no se puede realizar una placa en bipedestación, todas estas son proyecciones alternativas excepto una:
radiografía simple de abdomen en AP

4. En la obstrucción de intestino delgado:

la causa mas frecuente són las bridas intestinales tras la cirugía

5. En las hernias incarceradas:

las válvulas conniventes se delimitan perfectamente

6. En el Íleo paralítico postoperatorio o adinámico o Paralítico se caracteriza:
todas

7. Todos estos signos sugieren neumoperitoneo, excepto:
signo de escalera

8. El aire en el sistema biliar (aerobilia) se caracteriza
b y c son ciertas

9. En el gas localizado portal, todo es verdadero excepto:
se observan imágenes lineales en la región central

10. Dentro de los signos de líquido libre intrabdominal, están todos menos uno:
signos de diafragma continuo

