




### Navegación por el cuestionario



[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** martes, 9 de abril de 2019, 18:52  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** martes, 9 de abril de 2019, 19:10  
**Tiempo empleado** 17 minutos 53 segundos  
**Puntos** 14,00/20,00  
**Calificación** **7,00** de un máximo de 10,00 (**70%**)  
**Comentario** - Apto

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Desmarcar  
pregunta

Con respecto a la valoración del postoperatorio inmediato del trasplante hepático:

Seleccione una:

- a. Es necesario detectar un posible derrame pleural o lesión diafragmática.
- b. La distensión abdominal puede comprometer la función respiratoria.
- c. La nutrición enteral es mejor iniciarla cuanto más tarde posible para normalizar el tránsito intestinal.
- d. Si el débito del drenaje abdominal podemos sospechar de fístula biliar.

al contrario, es mejor iniciarla lo antes posible para evitar esta determinada complicación.

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Desmarcar  
pregunta

La clínica del EICH se presenta en tres niveles, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Piel.
- b. Hígado.
- c. Intestino.
- d. Sólo se produce en palmas de las manos y plantas de los pies. ✓

La clínica se produce principalmente en tres niveles, y la gravedad varía según el nivel. En el nivel hepático se produce una erupción eritematosa, que primero aparece en palmas, plantas y lóbulos generalizada. A nivel hepático aparece hepatomegalia, ictericia y aumento de las enzimas hepáticas. A nivel intestinal produce náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal e íleo.

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La donación en vivo:

Seleccione una:

- a. Se realiza bajo los mismos criterios que la donación cadáver.
- b. La mejora terapéutica del receptor justifica siempre esta práctica.
- c. Sólo se realiza en primera opción en casos muy concretos. ✓
- d. Los menores de edad no pueden donar en vivo por razones éticas.

La donación de vivo es un complemento a la donación de cadáver; sólo se realiza en casos muy concretos.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Desmarcar  
pregunta

La situación prioritaria donde el receptor potencial se encuentra en una situación de urgencia es:

Seleccione una:

- a. Urgencia Vital.
- b. Urgencia 0. ✓
- c. Urgencia no 0.
- d. Trasplante selectivo.

Los criterios clínicos son revisados anualmente por todos los equipos de trasplante y se dividen en tres prioridades: Urgencia 0: donde el receptor potencial está en priorización absoluta en todo el territorio nacional.(Página 4).

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

De forma general, en el post-operatorio inmediato de los pacientes trasplante se debe prevenir de infecciones. Señale cual de estos cuidados a este respecto es correcto:

Seleccione una:

- a. Administrar el tratamiento antibiótico profiláctico.
- b. Extremar medidas de asepsia en las manipulaciones de los catéteres centrales.
- c. Manipular al paciente en todo momento con guantes estériles. ✓
- d. Vigilar signos de infección en los puntos de inserción de drenajes.

Con la manipulación aséptica es suficiente, no es necesario la manipulación aséptica.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Los cuidados generales en el post-operatorio inmediato del trasplante cardíaco son:

Seleccione una:

- a. Comprobar la velocidad y dilución de las perfusiones de quirófano con solución salina.
- b. Conectar el drenaje mediastínico al sistema de aspiración.
- c. Estabilizar lugares de canalización de catéteres centrales.
- d. Administrar orthoclone para prevenir el rechazo del injerto. ✓

el Orthoclone es un medicamento para el tratamiento del rechazo corticosteroideo.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Con respecto a los cuidados del paciente diagnosticado de muerte y posible falsa):

Seleccione una:

- a. Estabilidad hemodinámica.
- b. Estabilidad ventilatoria.
- c. Cambios posturales. ✓
- d. Presión de perfusión adecuada.

Se prescindirán de los cuidados que inestabilicen hemodinámicamente al donante y de las manipulaciones no prioritarias.

**Pregunta 8**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Se encuentra legislado en España que el diagnóstico de muerte encefálica debe ser:

Seleccione una:

- a. Dos o más médicos.
- b. No interdependientes entre sí.
- c. No deben formar parte del grupo de trasplantes. ✗
- d. Uno de ellos, debe ser urólogo.

Se encuentra legislado que el diagnóstico de muerte encefálica debe ser realizado por un equipo de médicos interdependientes entre sí y además no deben formar parte del grupo de trasplantes.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

De las siguientes indicaciones para el trasplante cardíaco, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- a. Cardiopatías congénitas no solucionables desde el punto de vista quirúrgico.
- b. Cardiopatías congénitas operadas.
- c. Miocardiopatía dilatada.
- d. Bradicardia sinusal. ✓

página 23 del tema (rutas).

**Pregunta 10**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

 Marcar pregunta

La priorización territorial en la donación de órganos se realiza con el siguiente

Seleccione una:

- a. Territorio nacional>Zona>Comunidad>Autónoma>Ciudad>Hospital.
- b. Territorio nacional>Comunidad Autónoma>Zona>Ciudad>Hospital.
- c. Hospital>Ciudad>Comunidad Autónoma>Zona>Territorio nacional.
- d. Hospital>Ciudad>Zona>Comunidad Autónoma>Territorio nacional. 

La distribución del órgano se realiza por orden de prioridad: hospital-ciudad

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Con respecto al trasplante renal, señale la opción falsa:

Seleccione una:

- a. Es habitual que los pacientes porten dos sondas (vesical y tutor).
- b. Se valora la diuresis una vez al turno. 
- c. Es vital para la viabilidad del injerto que no se obstruyan las sondas, p
- d. De forma general, en las primeras 24h, se suele reponer el 100% del

Son pacientes que van a portar dos sondajes: vesical (por la uretra) y urete trasplantado y externalizado de forma transcutánea). Debemos valorar la d características de la orina. Es vital para la viabilidad del injerto que no se of fluidoterapia se va a adecuar a la diuresis horaria y a los resultados de las a primeras 24h, se va a reponer el 100% del volumen de la diuresis total de f después al 0,45%, junto con los iones precisos en cada momento (principal

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

En España un menor de edad puede donar en vivo:

Seleccione una:

- a. A receptores genéticamente relacionados y no relacionados.
- b. Puede donar cualquier órgano o tejido compatible con la vida.
- c. Solo con el consentimiento del tutor legal es suficiente.
- d. Ha de escucharse y tener en cuenta siempre la opinión del menor. 

Con respecto a los donantes vivos menores de edad, en España sólo se per hematopoyéticos a un receptor genéticamente relacionado. Además, los tut escrito y siempre se ha de escuchar y tener en cuenta la opinión del menor.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

¿Cuál de los siguientes cuidados del paciente trasplantado renal no pertenece

Seleccione una:

- a. Verificar la permeabilidad y correcta sujeción de las sondas vesical y t
- b. Realizar análisis periódicos para adecuar la fluidoterapia.
- c. Educación para la salud: evitar las exposiciones prolongadas al sol. 
- d. Vigilar la estabilidad hemodinámica para asegurar la viabilidad del inje

La educación para la salud no pertenece al postoperatorio inmediato, sino a

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

El tiempo de isquemia de algunos órganos es muy limitado. Esto es la causa

Seleccione una:

- a. Se priorice la distribución del órgano de forma local frente a la nacion
- b. Sea imposible la donación de algunos órganos.
- c. Se priorice la distribución del órgano de forma nacional frente a la loca
- d. Sea imposible la donación entre Comunidades Autónomas.

Los criterios territoriales se establecen con el objetivo de aumentar la eficie costes y los esfuerzos de los profesionales del trasplante. Además, hay que trasplantados tienen un tiempo de isquemia limitado por lo que se va a prio nacional.

**Pregunta 15**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El trasplante donde el donante y el receptor son de la misma especie pero r

Seleccione una:

- a. Autoinjerto.
- b. Aloinjerto.
- c. Isoinjerto. **X**
- d. Xenoinjerto.

El trasplante de tipo Aloinjerto o injerto alógeno es aquel en el que el donar genéticamente idénticos. Puede ser de donante vivo o cadáver.

**Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

los pacientes trasplantados precisan unas recomendaciones de autocuidado

Seleccione una:

- a. Aseo de manos antes y después de comer alimentos.
- b. No consumir alimentos sin garantías sanitarias.
- c. Pueden compartir utensilios de carácter personal.
- d. Evitar el contacto con personas portadoras de cualquier infección. **X**

Por higiene y por el riesgo de infección que supone, no deben compartir ute

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El traslado del donante al quirófano se realizará (señale la opción falsa):

Seleccione una:

- a. Monitorizado.
- b. Con ventilación mecánica.
- c. Con ventilación con bolsa autoinflable. **✓**
- d. Con las perfusiones continuas de medicación necesarias para la estabi

El traslado del donante al quirófano se realizará monitorizado, conectado al medicación necesarias para la estabilidad hemodinámica. Estas medidas se donante para la extracción de los órganos.

**Pregunta 18**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

La ONT, nace con el objetivo de coordinar y fomentar la donación y trasplar

Seleccione una:

- a. Órganos. **X**
- b. Tejidos.
- c. Células.
- d. Órganos, tejidos y células.

En 1989 nace en España la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) con y donación de órganos, tejidos y células en el territorio nacional.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El diagnóstico de muerte encefálica es médico y se basa en tres criterios, se

Seleccione una:

- a. Coma de etiología conocida y de carácter irreversible.
- b. Ausencia de reflejos cerebelosos. **✓**
- c. Ausencia de reflejos tronco encefálicos.
- d. Un período de observación.

El diagnóstico de muerte encefálica es médico y se basa en tres criterios clí irreversible, ausencia de reflejos troncoencefálicos y un período de observac

**Pregunta 20**

Incorrecta

La importancia de la valoración de enfermería en el pretrasplante renal se c

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

Seleccione una:

- a. Si el paciente está sometido a algún tratamiento renal sustitutivo.
- b. Valorar la integridad cutánea.
- c. Educación para la salud en cuanto a hábitos dietéticos. **X**
- d. Monitorizar la saturación de oxígeno.

página 8 del tema (rutas).

[Finalizar revisión](#)