


Navegación por el  
cuestionario
[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** miércoles, 17 de abril de 2019, 12:38  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** miércoles, 17 de abril de 2019, 12:48  
**Tiempo empleado** 10 minutos 1 segundos  
**Puntos** 14,00/20,00  
**Calificación** 7,00 de un máximo de 10,00 (70%)  
**Comentario -** Apto

**Información**
 Marcar  
pregunta

Paciente de 18 meses de edad que se encuentra en la Unidad de Cuidados I valoración por el equipo de trasplantes se decide incluirle en la lista de tras madre son compatibles por grupo sanguíneo y entraron en estudio para con finalmente llegó un órgano de donante cadáver. Finalmente se realiza el tra por cierre diferido.

**Pregunta 1**
 Incorrecta  
 Puntúa 0,00  
sobre 1,00

 Marcar  
pregunta

Este paciente, al estar en Urgencia no 0, tiene prioridad sobre:

Seleccione una:

- ☐ a. Ciudad.
- ☒ b. Comunidad Autónoma. **X**
- ☐ c. Zona geográfica.
- ☐ d. Territorio nacional.

Urgencia no 0: El receptor está en estado crítico, pero no cumplen los criterios geográficos.

**Pregunta 2**
 Incorrecta  
 Puntúa 0,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

La prueba que se realiza en el caso de donación en vivo cuando hay varios receptores es:

Seleccione una:

- ☐ a. Pruebas cruzadas.
- ☐ b. Cultivo mixto de linfocitos o cross-match.
- ☐ c. Pruebas de genética.
- ☒ d. Pruebas cruzadas múltiples. **X**

Cultivo mixto de linfocitos (cross-match): se realiza en el caso de donación ejemplo, con el objetivo de determinar qué familiar es más compatible con el receptor.

**Pregunta 3**
 Correcta  
 Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

En un donante cadáver menor de edad, ¿quién puede decidir sobre la donación?

Seleccione una:

- ☐ a. Su padre y madre.
- ☐ b. Su madre exclusivamente.
- ☒ c. Su tutor legal. **✓**
- ☐ d. Un menor no puede donar órganos.

El RD 1723/2012 especifica los requisitos que han de darse para poder realizar trasplantes a menores de edad o discapacitados, la negación la puede realizar su tutor legal.

**Pregunta 4**

Correcta

Para poder incluirle en la lista de espera para recibir un trasplante, es necesario que el paciente sea menor de edad o discapacitado, la opción falsa es:

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

Seleccione una:

- ☐ a. Pesar y tallar.
- ☐ b. Confirmar el grupo sanguíneo.
- ☐ c. Confirmar alergias.
- ☒ d. Medir el perímetro craneal en lactantes. ✓

Se les realizará un examen físico y anamnesis completos con el objetivo de trasplante. Se les pesa, talla y se registran las constantes vitales. Se mide e confirma el grupo sanguíneo y las alergias. Además, si no porta un acceso v VVP.

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

El tratamiento farmacológico previo al trasplante debe incluir:

Seleccione una:

- ☐ a. Inmunosupresión pretrasplante exclusivamente.
- ☐ b. Inmunosupresión pretrasplante y antibioterapia profiláctica.
- ☒ c. Inmunosupresión pretrasplante, antibioterapia profiláctica y descontar
- ☐ d. Inmunosupresión pretrasplante, antibioterapia profiláctica y laxante in

Se administrará la antibioterapia profiláctica, descontaminación intestinal (a trasplante.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Desmarcar  
pregunta

A su reingreso tras la intervención quirúrgica en la UCIP, podemos esperar

Seleccione una:

- ☐ a. Inestable hemodinámicamente.
- ☐ b. Con gafas nasales.
- ☒ c. Intubado. ✓
- ☐ d. Con drenaje pericárdico.

Son pacientes que ingresan intubados debido a la anestesia de la cirugía pe precoz.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

En este tipo de trasplante se intenta la extubación precoz de forma program situaciones que puede producir dificultad respiratoria:

Seleccione una:

- ☐ a. Derrame pleural.
- ☐ b. Distensión abdominal.
- ☐ c. Lesión diafragmática.
- ☒ d. Nutrición continua por sonda transpilórica. ✓

Puede comprometer la función respiratoria en este tipo de trasplante la lesi abdominal habitual en estos pacientes (debido al mayor tamaño del injerto)

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

El paciente ingresa intubado de quirófano, ¿qué es lo primero que deberem

Seleccione una:

- ☐ a. La permeabilidad de la sonda vesical.
- ☐ b. La fijación de los catéteres centrales.
- ☒ c. La correcta posición y fijación del tubo endotraqueal. ✓
- ☐ d. La permeabilidad y débito del drenaje abdominal.

Siempre que llega un paciente intubado lo primero que debemos hacer es a y fijación del tubo endotraqueal.

**Pregunta 9**

Correcta

¿Cuál parámetro no es necesario que valoremos y registremos en este pacie

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

Seleccione una:

- ☐ a. Saturación de oxígeno.
- ☐ b. Tensión arterial invasiva.
- ☐ c. Frecuencia cardíaca.
- ☒ d. Gasto cardíaco. ✓

Los pacientes con este tipo de trasplantes ingresan casi siempre con un un cardíaco sólo es necesario medirlo en el trasplante cardíaco, que para tal fin

#### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

Se decide extubarle de forma precoz y le ponemos un sistema de alto flujo.

Seleccione una:

- ☐ a. Frecuencia respiratoria.
- ☐ b. Patrón respiratorio.
- ☒ c. Diuresis. ✓
- ☐ d. Saturación de oxígeno.

Cuando extubamos a un paciente lo primero es vigilar la aparición de dificultad

#### Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

Observamos que el débito del drenaje abdominal tiene una ligera coloración

Seleccione una:

- ☐ a. Sangrado activo.
- ☒ b. Infección. ✗
- ☐ c. Perforación intestinal.
- ☐ d. Fístula biliar.

Al tener una fístula biliar, la bilis (de coloración biliosa o verdosa) pasa al es drenaje abdominal.

#### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

La estabilidad hemodinámica es esencial para asegurar la adecuada perfusión estrecha a este respecto:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipotensión.
- ☐ b. Taquicardia.
- ☐ c. Mala perfusión periférica.
- ☒ d. Poliuria. ✓

Todos son signos de hipotensión o inestabilidad hemodinámica excepto la p

#### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

 Desmarcar  
pregunta

Es importante iniciar la nutrición enteral lo antes posible para evitar la trasl necesario valorar para este fin:

Seleccione una:

- ☐ a. Débito gástrico.
- ☐ b. Distensión abdominal.
- ☒ c. Balance hídrico. ✓
- ☐ d. Ruidos intestinales.

El balance hídrico no determina el inicio de la nutrición enteral.

#### Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Si alguno de los padres hubiera sido el donante, este tipo de trasplante se p

Seleccione una:

- ☒ a. Xenoinjerto concordante. ✗
- ☐ b. Isoinjerto.



- ☐ c. Aloinjerto.
- ☐ d. Xenoinjerto discordante.

Aloinjerto, tanto fueran los padres como otro ser humano no emparentado.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Estando los padres en estudio para ser los donantes, ¿cuál puede ser la cau

Seleccione una:

- ☐ a. Para no desaprovechar el órgano porque en la población pediátrica ha
- ☐ b. Para ahorrar costes.
- ☐ c. Porque siempre será más compatible con un sujeto no emparentado.
- ☒ d. Porque la donación en vivo sólo se realiza en primera opción en casos

La donación de vivo es un complemento a la donación de cadáver; sólo se r

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Suponiendo que el donante fuera la madre, y en el estudio preanestésico se sangrado, ¿se realizaría la donación?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, porque lo prioritario es la mejoría del receptor.
- ☐ b. Sí, porque la madre ha firmado el consentimiento informado de la exti responsabilidad legal al equipo de trasplantes.
- ☐ c. No, porque la ley prohíbe la donación en vivo entre individuos emocior
- ☒ d. No, porque siempre se prioriza la protección del donante vivo frente a

La mejora terapéutica del receptor nunca debe justificar la no protección int

### Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



¿Cuál es la definición de donante?

Seleccione una:

- ☐ a. "Persona que durante su vida o después de su muerte, ya sea por su \ componentes anatómicos con el fin de utilizarlos para trasplantes en otra p
- ☐ b. "Persona que durante su vida o después de su muerte, ya sea por su \ componentes anatómicos con el fin de utilizarlos para trasplantes en otra p
- ☒ c. "Persona que efectúe la donación en vida de aquellos órganos, o parte la vida y cuya función pueda ser compensada por el organismo del donante
- ☐ d. "Persona que efectúe la donación en vida de aquellos órganos, o parte la vida y cuya función pueda ser compensada en especies por la ONT".

"Persona que durante su vida o después de su muerte, ya sea por su volunt componentes anatómicos con el fin de utilizarlos para trasplantes en otra p definición hace referencia al donante vivo. Nunca se percibirá por parte del especies.

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Al ingreso del paciente de quirófano tras la realización del trasplante, y una actuación más pertinente?

Seleccione una:

- ☐ a. Informar a los padres y aconsejarles que se vayan a descansar a casa
- ☐ b. Informar a los padres y comunicarles que se terminó el horario de visi
- ☒ c. Informar a los padres y permitir su entrada al box del paciente. ✓
- ☐ d. Permitir la entrada de los padres a la unidad y comunicarles que el tie se les informará.

Una vez estabilizado al niño, se informa a los padres y se permite la entradi

### Pregunta 19

Incorrecta

En el postoperatorio inmediato el paciente está severamente inmunosuprim

Seleccione una:

Puntúa 0,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

- ☐ a. Extremar las medidas de higiene y aislamiento.
- ☐ b. Manipular al paciente con guantes estériles en todo momento.
- ☒ c. Manipular al paciente con guantes y bata estéril en todo momento. **X**
- ☐ d. La ropa de cama del paciente será estéril.

Extremar las medidas de higiene y aislamiento.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Con respecto al tacrolimus, debemos tener en cuenta que:

Seleccione una:

- ☐ a. Generalmente se administra de forma intravenosa.
- ☐ b. Es compatible con zumo de uva y piña.
- ☒ c. Se debe mantener al paciente a dieta absoluta una hora antes y despu
- ☐ d. Se debe mantener al paciente a dieta absoluta una hora antes de su ir

Se debe mantener al paciente a dieta absoluta una hora antes y después de

[Finalizar revisión](#)