

**Pregunta 1**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En la escala de trauma pediátrica, que peso aumenta la puntuación en un punto (+1)

Seleccione una:

- a. mayor que 20 Kg
- b. Entre 10 a 20 Kg ✓
- c. menor que 10 Kg
- d. menor que 5 Kg

**Pregunta 2**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Las soluciones quirúrgicas a la atonía uterina postparto, son todas menos una de las siguientes, señala cual

Seleccione una:

- a. Abdominoplastia ✓
- b. Legrado
- c. Ligadura de vasos
- d. Embolización de vasos uterinos

**Pregunta 3**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La referencia para el ajuste de medicación pediátrica se hace por

Seleccione una:

- a. Peso
- b. Edad
- c. Edad y peso ✓
- d. Altura en cm

**Pregunta 4**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Cual es generalmente la más óptima posición de una gestante ante cualquier tipo de urgencia

Seleccione una:

- a. Decubito lateral derecho
- b. Decubito prono
- c. Decubito lateral izquierdo ✓
- d. Bipedestación

**Pregunta 5**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La relación de compresiones:ventilaciones torácicas para una RCP básica realizada por personal sanitario de un paciente pediátrico será

Seleccione una:

- a. .30:2
- b. 100-120 min
- c. 15:2 ✓
- d. .15:15

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

No es un tipo de placenta previa

Seleccione una:

- a. Lateral o baja (Tipo I)
- b. Marginal (Tipo II)
- c. Absoluta (Tipo V) ✓
- d. Oclusiva total (tipo IV)

**Pregunta 7**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Es un abrupcio placentae lo mismo que un desprendimiento de placenta

Seleccione una:

- a. No ✗
- b. Sólo en mujeres que hablen latín
- c. Si
- d. Varía si es anterior o posterior

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La presencia de múltiples fracturas o alguna fractura abierta, en el trauma score pediátrico implica

Seleccione una:

- a. Restar 2 puntos (-2)
- b. Restar 1 punto (-1) ✓
- c. Sumar 1 punto (+1)
- d. Sumar 2 puntos (+2)

**Pregunta 9**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

No es un parámetro genérico de ventilación mecánica pediátrica

Seleccione una:

- a. En menores de 6 meses de 30-40 respiraciones/min
- b. PEEP de 3 a 5 cmH<sub>2</sub>O
- c. PEEP de 5 a 10 cmH<sub>2</sub>O
- d. Entre 6 meses y 5 años de 20 a 30 respiraciones/min ✗

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La clasificación de Taussig se aplica para valorar la gravedad de

Seleccione una:

- a. Procesos respiratorios ✓
- b. Insuficiencia cardíaca
- c. Alergia cutánea
- d. Dermatitis

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

El test de APGAR valora

Seleccione una:

- a. Color (apariciencia) - Respuesta a estímulos - Tono muscular - Respiración ✓
- b. Apariencia - Respiración - Circulación
- c. Apertura de ojos - Respuesta verbal (llanto) - Respuesta motora
- d. Nivel de bilirrubina

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

La dosis pediátrica para nebulización de adrenalina es

Seleccione una:

- a. 1mg/kg
- b. 1,5 mg/kg
- c. 0,5 mg/kg ✓
- d. 0,75 mg/kg

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Los tipos de rotura uterina son

Seleccione una:

- a. Completa y parcial o incompleta ✓
- b. Total y No total
- c. Primaria y Secundaria
- d. Alta y Baja

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

En urgencias gineco-obstetricas, el acrónimo DPPNI significan

Seleccione una:

- a. Diabetes Prevention Program Natural Incubation
- b. Diagnostico Potencial de Parada No Irreversible
- c. Desprendimiento Prematuro de Placenta NormoInserta ✓

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

La vasa previa es

Seleccione una:

- a. La denominación popular de la placenta previa
- b. Una afección poco frecuente en la que los vasos fetales atraviesan las membranas amnióticas por encima del cuello del útero y por debajo de la presentación fetal. ✓
- c. Un prolapsos inverso de cordón
- d. Una hipertonia uterina

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00  
Marcar pregunta

Dentro de las medidas físicas para reducir la fiebre de un niño, los baños templados deberan estar a

Seleccione una:

- a. 1°C por debajo de la temperatura del niño ✓
- b. 2° por debajo
- c. A la misma temperatura que el niño
- d. 1° por encima para conseguir la transferencia transversa de temperatura inversa

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Si aplicamos la tabla de "altura uterina en gestación", a que altura estará el borde superior del utero a las 36 semanas

Seleccione una:

- a. Sinfisis del pubis
- b. A la altura del ombligo
- c. Reborde costal ✓
- d. A 1/3 por debajo del ombligo, pero a la mitad de la distancia de ese tercio hasta la sinfisis del pubis

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Limite de edad que marca la diferencia en los ítem de respuesta motora y apertura ocular, en la escala de glasgow modificada para pacientes pediátricos

Seleccione una:

- a. 5 años
- b. 10 años
- c. 1 año ✓
- d. 3 años

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Son factores de riesgo de atonía uterina, todos menos uno, indica cual

Seleccione una:

- a. Parto prolongado
- b. Multipara
- c. Parto prematuro ✓
- d. Desprendimiento Prematuro de Placenta NormoInserta

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La puntuación de menor gravedad en la escala de downes-wood

Seleccione una:

- a. De 1 a 3 puntos ✓
- b. De 4 a 7 puntos
- c. De 8 a 14 puntos
- d. Más de 14 puntos